


ALVERSTONE RUSSET

CRE 98- 200 X INNOVATOR



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Geschikt voor QSR
- Stabiel laag suikergehalte
- Zeer knapperige textuur
- Am- resistentie tegen Pa2 & Pa3
- Geschikt voor lange bewaring



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	61	Midden laat
Kiemrust	60	Gemiddeld
Opbrengst rijp	104	Vrij hoog
Grofheid	82	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Bruin
Vleeskleur na koken		Wit
Kooktype		BC - Kruimig
Droge stof/Zetmeel %		22,7% / 16,7%
OWG/Soortelijk gewicht		420 / 1,091
Blauwgevoeligheid	11	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	56	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	90	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	40.000	33	28
35/55	36.000	37	31
50/55	35.000	38	32
55/65	34.000	39	33
55/65 gesneden	40.000	33	28

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	40	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	75	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Schurft	51	● ● ● ● ●
Poederschurft	59	● ● ● ● ●
Kringerigheid	85	● ● ● ● ●
Y-virus	33	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3	● ● ● ● ●
Ro5	● ● ● ● ●
Pa2 *9	● ● ● ● ●
Pa3 *9	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1 *10	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ●
F18 *1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 275 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- ALVERSTONE RUSSET reageert goed op het snijden van de grote potermaat. Het beste resultaat wordt verkregen bij 3-4 weken voor het planten.
- Op lichte gronden met vrijlevende aaltjes is er een verhoogd risico op kringerigheid. Gebruik nematicides.
- Voorkiemen is niet nodig, ALVERSTONE RUSSET kan worden geplant in het witte puntjes stadium.
- Knollen groeien vrij diep en verspreid in de rug.
- Op Rhizoctonia-gevoelige gronden wordt een grondbehandeling geadviseerd.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- De opkomst is een beetje traag, later ontwikkelt het loof zich goed.
- Mooi dekkend gewas.
- Groeit verspreid in de rug.
- ALVERSTONE RUSSET is gevoelig voor metribuzin, ook bij toediening voor de opkomst.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- ALVERSTONE RUSSET is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.



Loofdoding en oogst

- Zorgdragen voor een afgerijpt gewas tijdens de loofvernietiging.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.



Bewaring

- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.
- Gebruik de hoogste dosis kiemremmer bij de eerste behandeling.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.