

# ANNABELLE

NICOLA X MONALISA



**HZPC**  
keeps you growing



## Anbauempfehlung Speisekartoffeln France CHAIR FERME

- Sehr gut geeignet für den Frühkartoffelanbau
- Festkochend
- Gleichmäßige Sortierung und Knollenform
- Sehr guter Geschmack



### Sorteneigenschaften

Reifezeit	76	Früh
Keimruhe	28	Kurz
Ertrag	90	Ziemlich gut
Sortierung	72	Kleinfallend
Knollenform		Lang-oval
Knollenzahl		12-14
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Dunkelgelb
Kochtyp		A - Festkochend
TS/Stärke %		18,3% / 12,5%
UWG/Spez. Gewicht		331 / 1,07
Blaufleckigkeit	4	Nicht empfindlich
Metribuzin Empf.	60	●●●●●●●●
Knöllchensucht	82	●●●●●●●●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

### Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/30	55 000	24	20
30/40	50.000	27	22
40/45	45.000	28	23
45/50	38 000	35	29
28/32	55.000	24	20
32/45	47.500	25	21
32/50	43.000	31	26

### Resistenz

Krautfäule	32	●●●●●●●●
Knollenfäule	44	●●●●●●●●
Alternaria	60	●●●●●●●●
Schorf	51	●●●●●●●●
Pulverschorf	56	●●●●●●●●
Eisenfleckigkeit	90	●●●●●●●●
Y-Virus	40	●●●●●●●●
Yntn Knollentoleranz	69	●●●●●●●●

### Nematodenresist.

Ro1/4	9	●●●●●●●●	F1	10	●●●●●●●●
Ro2/3	8	●●●●●●●●	F2	6	●●●●●●●●
Pa2	*3	●●●●●●●●	F6	7	●●●●●●●●
Pa3		●●●●●●●●	F18	6	●●●●●●●●

\* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

### Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Die Stickstoffgabe sollte zum 2/3 vor dem Pflanzen und zum 1/3 nach dem Knollenansatz erfolgen.
- Der Einsatz von Langzeitdüngern empfiehlt sich, um die Wachstumszeit zu verlängern.
- Stickstoff (N): Hoher Bedarf (210-250kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Kaliumchlorid (KCl) mindestens 6 Wochen vor dem Pflanzen ausbringen, da spätere Gaben einen niedrigen Stärkegehalt verursachen können.
- Mangan und Magnesium fördern eine starke Laubentwicklung und verhindern eine vorzeitige Abreife.

# ANNABELLE

NICOLA X MONALISA



**HZPC**  
keeps you growing



## Anbauempfehlung Speisekartoffeln France CHAIR FERME



### Vorbereitung und Pflanzung

- ANNABELLE hat eine kurze Keimruhe.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen an den örtlichen Gegebenheiten akklimatisieren.
- ANNABELLE Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.




### Anbau

- Die Anwendung von Metribuzin wird im Voraufbau empfohlen. Im Nachaufbau sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- Die Witterungsbedingungen haben einen starken Einfluss auf die Effektivität von Metribuzin. Passen Sie die Dosis an die jeweiligen Umstände an.
- Durch Beregnung wird eine gleichmäßigere Produktqualität mit besseren Kocheigenschaften erzielt.
- Eine zu hohe Beregnungsgabe am Ende der Vegetation erhöht die Gefahr auf ausgeprägten Lentitellen.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.
- ANNABELLE ist anfällig gegen Yntn-Virus, daher ist eine konsequent durchgeführte Blattlausbekämpfung wichtig.



### Krautregulierung und Ernte

- Ziel ist ein UWG von 305 Gramm.
- Starten Sie etwa 3 Wochen vor dem erwarteten Erntetermin mit der Messung vom UWG.
- Die Knollen sollten vor der Ernte komplett schalenfest sein.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.
- ANNABELLE ist ziemlich resistent gegen Blaufleckigkeit, sofern keine extreme Bedingungen auftreten.
- Kleine Rodebeschädigungen führen zur Austrocknung und früher Keimung.



### Lagerung

- ANNABELLE ist eine frühe Sorte und die Vermarktung sollte innerhalb von 5 Monaten nach der Ernte erfolgen.
- Lagertemperatur: 4 °C.
- Eine stabile Temperatur während der Lagerung beugt der Entwicklung von Silberschorf vor.