

ANNABELLE

NICOLA X MONALISA



HZPC
keeps you growing

Producción de consumo France CHAIR FERME

- Muy apropiada para cosecha temprana
- Cocción firme
- Tubérculos de tamaño y forma uniformes
- Muy buen gusto



Propiedades agronómicas

Maduración	76	Temprana
Período de dormencia	28	Corto
Producción	90	Razonable
Tamaño del tubérculo	72	Calibre pequeño
Forma		Oval-alargada
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla oscuro
Tipo de cocción		A - Firme
Materia seca/Almidón %		18,3% / 12,5%
/Peso específico		331 / 1,07
Golpeo interno	4	No sensible
Sens. Metribuzin	60	●●●●●●
Fenómeno patatitas	82	●●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de cocción



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/30	55.000	24	20
30/40	50.000	27	22
40/45	45.000	28	23
45/50	38.000	35	29
28/32	55.000	24	20
32/45	47.500	25	21
32/50	43.000	31	26

Resistencias

Mildiú en planta	32	●●●●●●
Mildiú en el tubérculo	44	●●●●●●
Alternaria	60	●●●●●●
Sarna común	51	●●●●●●
Sarna verrugosa	55	●●●●●●
Spraing	90	●●●●●●
Virus Y	40	●●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	69	●●●●●●

Res. a nemátodos		Roña			
Ro1/4	9	●●●●●●	F1	10	●●●●●●
Ro2/3	8	●●●●●●	F2	6	●●●●●●
Ro5	*9	●●●●●●	F6	7	●●●●●●
Pa2	*3	●●●●●●	F18	6	●●●●●●
Pa3		●●●●●●			

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Consulte siempre las normas locales vigentes sobre fertilización de cultivos.
- Se aconseja una liberación lenta de nutrientes para incrementar el período de cultivo.
- Nitrógeno (N): aporte alto (210-250Kg N/ha incluido las reservas del suelo).
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- No aplicar cloruro potásico (KCl) menos seis semanas antes de la plantación, ya que las aplicaciones tardías pueden provocar un menor contenido de materia seca.
- El manganeso y el magnesio proporcionan una planta fuerte y previenen la senescencia prematura.

ANNABELLE

NICOLA X MONALISA



HZPC
keeps you growing

Producción de consumo France CHAIR FERME



Cultivo

- ANNABELLE tiene una dormencia corta.
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales.
- Tratar siempre la semilla de ANNABELLE contra rizoctonia.




Período de cultivo

- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- Las condiciones climáticas tienen una fuerte influencia en la efectividad del metribuzin, hay que adaptar la dosis según las circunstancias.
- El riego proporciona un producto más uniforme con mejor calidad culinaria.
- Los riegos demasiado abundantes aumentan la dominancia de las lenticelas.
- Utilizar tratamientos estrictos contra Phytophthora, ya que es muy susceptible en planta y tubérculo.
- ANNABELLE es susceptible al virus Yntn, por lo tanto realizar un estricto control de los pulgones.



Destrucción de las plantas

- Materia seca deseada del 17 %.
- Empezar a medir la materia seca tres semanas antes de la cosecha.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha.
- Mínimo tres semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- ANNABELLE es muy resistente al golpeo, a menos que se produzcan condiciones extremas.
- Pequeños daños durante la cosecha provocan deshidratación y brotación temprana.



Almacenamiento

- ANNABELLE es una variedad temprana y, por lo tanto su venta se realiza normalmente durante los cinco meses posteriores a la cosecha.
- Temperatura de almacenamiento: 4 °C.
- Unas temperaturas estables durante el almacenamiento evitan el desarrollo de sarna plateada.