

ANNABELLE

NICOLA X MONALISA



HZPC
keeps you growing

Producción de consumo SOUTH EUROPE

- **Muy buen gusto**
- **Cocción firme**
- **Muy apropiada para cosecha temprana**
- **Tubérculo de calibre y forma uniformes**



Propiedades agronómicas

Maduración	76	Temprana
Período de dormencia	28	Corto
Producción	90	Razonable
Tamaño del tubérculo	72	Calibre pequeño
Forma		Oval-alargada
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla oscuro
Tipo de cocción		A - Firme
Materia seca/Almidón %		18,3% / 12,5%
/Peso específico		331 / 1,07
Golpeo interno	4	No sensible
Sens. Metribuzin	60	●●●●●●
Fenómeno patatitas	82	●●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de cocción



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 35-55 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
35/45	68.000	20	16
35/50	54.000	25	21
50/60 semilla cortada	56.000	24	20

Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildíu en planta	32	●●●●●●
Mildíu en el tubérculo	44	●●●●●●
Alternaria	60	●●●●●●
Sarna común	51	●●●●●●
Sarna verrugosa	55	●●●●●●
Spraing	90	●●●●●●
Virus Y	40	●●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	69	●●●●●●

Res. a nemátodos		Roña			
Ro1/4	9	●●●●●●	F1	10	●●●●●●
Ro2/3	8	●●●●●●	F2	6	●●●●●●
Ro5	*9	●●●●●●	F6	7	●●●●●●
Pa2	*3	●●●●●●	F18	6	●●●●●●
Pa3		●●●●●●			

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Se aconseja una liberación lenta de nutrientes para incrementar el período de cultivo.
- Nitrógeno (N): aporte alto (210-250Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- No aplicar cloruro potásico (KCl) menos seis semanas antes de la plantación, ya que las aplicaciones tardías pueden provocar un menor contenido de materia seca.
- El abono orgánico ayudará mantener el vigor del cultivo.
- Manténgase la planta vigorosa.

ANNABELLE

NICOLA X MONALISA



HZPC
keeps you growing

Producción de consumo SOUTH EUROPE



Cultivo

- ANNABELLE tiene una dormencia corta.
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales.
- Cuando se desbrote, evitar la condensación en los tubérculos.
- Si hay tallos largos, hay que quitarlos y dejarlos secar antes de plantar.
- ANNABELLE reacciona bien al cortar la semilla de calibre gordo. Da mejores resultados cuando se hace 3-4 semanas antes de la plantación.
- Al cortar se incrementa el peligro de infección. Desinfectar el cuchillo. Secar pronto para su curación. Con climas más fríos esperar 3-4 semanas antes de plantar.
- Se recomienda tratar el tubérculo o el suelo contra rizoctonia, sarna plateada y otras enfermedades de la piel. Azoxystrobin en el suelo da buenos resultados contra hongos.
- ANNABELLE se puede cultivar en todo tipo de suelos.
- Plantar ANNABELLE 3 cm más profundo para conseguir unas raíces más fuertes y una mejor absorción de nutrientes.




Período de cultivo

- Desarrollo débil de la planta, aplicar una dosis inicial alta de nitrógeno.
- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- Las condiciones climáticas tienen una fuerte influencia en la efectividad del metribuzin, hay que adaptar la dosis según las circunstancias.
- ANNABELLE parece sensible a clomazone también combinado con otros herbicidas.
- El riego proporciona un producto más uniforme con mejor calidad culinaria.
- Una sobredosis de nitrógeno da lugar a una mayor sensibilidad al mildiu.
- Utilizar tratamientos estrictos contra Phytophthora, ya que es muy susceptible en planta y tubérculo.



Destrucción de las plantas

- Materia seca deseada del 18,5 %.
- Empezar a medir la materia seca tres semanas antes de la cosecha.
- Un poco de agua después de quemar ayuda a evitar daños de insectos, caballones cerrados y frescos. El rulo por encima también resulta útil.
- Cosechar a menos de 25 °C para evitar pudriciones.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha.
- ANNABELLE es muy resistente al golpeo, a menos que se produzcan condiciones extremas.
- Pequeños daños durante la cosecha provocan deshidratación y brotación temprana.
- Las patatas necesitan estar suficientemente secas antes de su envasado. Los sacos Jumbo deben tener tiras de ventilación para mantener la calidad de la cosecha.



Almacenamiento

- La temperatura recomendada para almacenamientos temporales es de 10 °C.
- Se debería transportar en camiones refrigerados a 10 °C.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.