ANNABELLE

NICOLA X MONALISA

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- **Excellent goût**
- **Variété chair ferme**
- **Très adaptée aux marchés primeurs**
- **Tubercules réguliers en forme et calibre**
- **Bonne résistance aux coups bleus**

Caractéristiques agronomiques

Maturité	76	Hâtive
Période de dormance	28	Courte
Rendement à maturité	90	Moyen
Calibre	72	Moyen petit
Forme		Oblong allongé
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune foncé
Type de cuisson		A - Ferme
Matière sèche/Amidon %		18,3% / 12,5%
Poids sous l'eau/		331 / 1,07
Noircissement interne	4	Pas de sensibilité
Sens. à la Métribuzine	60	
Boulage	82	

Couleur de peau et chair

Type de cuisson

Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 35-55 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs 75 cm	Inter-rangs 90 cm
28/35	60 000	22	19
35/45	52 000	26	21
45/55	40 000	33	28

Profondeur de plantation: 3 cm plus profond que la normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	32
Mildiou du tubercule	44
Alternaria	60
Gale commune	51
Gale poudreuse	55
Virus rattle du tabac	90
Virus Y	40
Yntn virus sur tubercule	69

Nématodes		Galle Verruqueuse	
Ro1/4	9	F1	10
Ro2/3	8	F2	6
Ro5	*9	F6	7
Pa2	*3	F18	6
Pa3			

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Azote (N): 110% des quantités normalement apportées sur une variété demi-hâtive.
- Des engrais à libération lente sont recommandés de façon à maintenir un cycle de culture plus long.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Ne pas appliquer de chlorure de potasse (KCl) moins de 6 semaines avant la plantation, des apports trop tardifs pouvant induire des taux de matière sèche trop bas.
- La fumure organique aidera à maintenir une culture vigoureuse.
- Veiller à maintenir un feuillage vigoureux.

L'usage de ces informations est sous la responsabilité de l'utilisateur qui doit les adapter à sa situation. HZPC décline toute responsabilité.

ANNABELLE

NICOLA X MONALISA

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation



Plantation

- ANNABELLE présente une dormance courte.
- Habituer les plants à la température ambiante avant plantation.
- Lors du dégermage, éviter la condensation sur les tubercules.
- Si un plant a de longs germes, dégermer et laisser sécher avant plantation.
- ANNABELLE réagit bien à la coupe de gros calibres. Il est conseillé de couper 3-4 semaines avant plantation.
- Couper entraîne un risque d'infection. Désinfecter le couteau et utiliser du talc. Sécher rapidement pour une bonne cicatrisation. Pour des climats plus froids, couper 3-4 semaines avant plantation.
- Le traitement des plants et/ou du sol est conseillé pour contrôler le rhizoctone, la gale argentée et d'autres maladies telluriques affectant la peau. Appliquer de l'azoxystrobine sur le sol donne de bons résultats sur beaucoup de champignons.
- ANNABELLE peut être cultivée sur tous types de sols.
- Nous recommandons de planter ANNABELLE 3 cm plus profond que la normale pour renforcer le système racinaire et l'assimilation des nutriments.



Culture

- Appliquer une dose initiale d'azote importante si le développement du feuillage est faible.
- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Pour une bonne efficacité, adapter la dose de métribuzine en fonction des conditions météo.
- ANNABELLE semble sensible au clomazone seul ou combiné à d'autres herbicides.
- Une culture irriguée produira une récolte plus uniforme et de meilleure qualité culinaire.
- Une surfertilisation en azote peut entraîner une plus grande sensibilité au mildiou.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou sur feuillage et tubercules.



Défanage et Récolte

- Viser une teneur en matière sèche de 19 %.
- Commencer le contrôle de la teneur en matière sèche environ 3 semaines avant la récolte.
- Porter une attention particulière au défanage pour obtenir la meilleure qualité culinaire.
- Pour une dormance optimale, défaner une culture sénescente.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte.
- ANNABELLE est assez résistante aux coups bleus (sauf en conditions extrêmes).
- Des micro-dommages lors de la récolte provoqueront une augmentation de la déshydratation en stockage et une germination plus précoce.



Conservation

- ANNABELLE est une variété hâtive. Par conséquent, les ventes se font normalement dans les 5 mois suivant la récolte.
- Pour une période de conservation supérieure à 3 mois, un stockage réfrigéré est requis.
- Afin d'éviter une déshydratation importante, refroidir avec une faible amplitude thermique entre l'air de refroidissement et les tubercules.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO_2.
- Toute fluctuation de température, combinée à de la condensation, peut se traduire par une germination précoce et un risque plus élevé de gale argentée.

L'usage de ces informations est sous la responsabilité de l'utilisateur qui doit les adapter à sa situation. HZPC décline toute responsabilité.