ANNABELLE

NICOLA X MONALISA

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France CHAIR FERM

- **Très adaptée aux marchés primeurs**
- **Variété chair ferme**
- **Tubercules réguliers en forme et calibre**
- **Excellent profil gustatif**

Caractéristiques agronomiques

Maturité	76	Hâtive
Période de dormance	28	Courte
Rendement à maturité	90	Moyen
Calibre	72	Moyen petit
Forme		Oblong allongé
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune foncé
Type de cuisson		A - Ferme
Matière sèche/Amidon %		18,3% / 12,5%
Poids sous l'eau/		331 / 1,07
Noircissement interne	4	Pas de sensibilité
Sens. à la Métribuzine	60	
Boulage	82	

Couleur de peau et chair

Type de cuisson

Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs 75 cm	Inter-rangs 90 cm
28/30	55 000	24	20
30/40	50.000	27	22
40/45	45.000	28	23
45/50	38 000	35	29
28/32	55.000	24	20
32/45	47.500	25	21
32/50	43.000	31	26

Résistances

Mildiou du feuillage	32
Mildiou du tubercule	44
Alternaria	60
Gale commune	51
Gale poudreuse	55
Virus rattle du tabac	90
Virus Y	40
Yntn virus sur tubercule	69

Nématodes

Ro1/4	9
Ro2/3	8
Ro5	*9
Pa2	*3
Pa3	

Galle Verruqueuse

F1	10
F2	6
F6	7
F18	6

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre région.
- Des engrais à libération lente sont recommandés de façon à maintenir un cycle de culture plus long.
- Azote (N): Besoins élevés (210-250 kg N/ha, reliquats inclus).
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Ne pas appliquer de chlorure de potasse (KCl) moins de 6 semaines avant la plantation, des apports trop tardifs pouvant induire des taux de matière sèche trop bas.
- Des apports de manganèse et de magnésium encourageront le développement d'un feuillage robuste et préviendront une sénescence prématurée.

L'usage de ces informations est sous la responsabilité de l'utilisateur qui doit les adapter à sa situation. HZPC décline toute responsabilité.

27 Mai 2025

www.hzpc.com

Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau
au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com

ANNABELLE

NICOLA X MONALISA

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France CHAIR FERM



Plantation

- ANNABELLE présente une dormance courte.
- Habituer les plants à la température ambiante avant plantation.
- Toujours traiter les plants de ANNABELLE contre le rhizoctone.

Culture

- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Pour une bonne efficacité, adapter la dose de métribuzine en fonction des conditions météo.
- Une culture irriguée produira une récolte plus uniforme et de meilleure qualité culinaire.
- Un excès d'irrigation tard dans le cycle augmente l'apparition de lenticelles.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou sur feuillage et tubercules.
- ANNABELLE est sensible au virus Yntn, il faut donc prévoir un programme aphicide complet.



Défanage et Récolte

- Viser une teneur en matière sèche de 17 %.
- Commencer le contrôle de la teneur en matière sèche environ 3 semaines avant la récolte.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte.
- Respecter un délai défanage - récolte de 3 semaines minimum.
- ANNABELLE est assez résistante aux coups bleus (sauf en conditions extrêmes).
- Des micro-dommages lors de la récolte provoqueront une augmentation de la déshydratation en stockage et une germination plus précoce.



Conservation

- ANNABELLE est une variété hâtive. Par conséquent, les ventes se font normalement dans les 5 mois suivant la récolte.
- Température de stockage : 4 °C.
- Une température de stockage régulière limitera l'apparition de gale argentée.

L'usage de ces informations est sous la responsabilité de l'utilisateur qui doit les adapter à sa situation. HZPC décline toute responsabilité.

27 Mai 2025

www.hzpc.com

Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau
au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com