

ANNABELLE

NICOLA X MONALISA



HZPC
keeps you growing

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation SOUTH EUROPE

- Excellent goût
- Variété chair ferme
- Très adaptée aux marchés primeurs
- Tubercules réguliers en forme et calibre



Caractéristiques agronomiques

Maturité	76	Hâtive
Période de dormance	28	Courte
Rendement à maturité	90	Moyen
Calibre	72	Moyen petit
Forme		Oblong allongé
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune foncé
Type de cuisson		A - Ferme
Matière sèche/Amidon %		18,3% / 12,5%
Poids sous l'eau/		331 / 1,07
Noircissement interne	4	Pas de sensibilité
Sens. à la Métribuzine	60	●●●●●●
Boulage	82	●●●●●●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 35-55 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
35/45	68 000	20	16
35/50	54 000	25	21
50/60 coupé	56 000	24	20

Profondeur de plantation: 3 cm plus profond que la normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	32	●●●●●●
Mildiou du tubercule	44	●●●●●●
Alternaria	60	●●●●●●
Gale commune	51	●●●●●●
Gale poudreuse	55	●●●●●●
Virus rattle du tabac	90	●●●●●●
Virus Y	40	●●●●●●
Yntn virus sur tubercule	69	●●●●●●

Nématodes		Galle Verruqueuse	
Ro1/4	9	F1	10
Ro2/3	8	F2	6
Ro5	*9	F6	7
Pa2	*3	F18	6
Pa3			

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Des engrais à libération lente sont recommandés de façon à maintenir un cycle de culture plus long.
- Azote (N): Besoins élevés (210-250 kg N/ha, reliquats inclus).
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Ne pas appliquer de chlorure de potasse (KCl) moins de 6 semaines avant la plantation, des apports trop tardifs pouvant induire des taux de matière sèche trop bas.
- La fumure organique aidera à maintenir une culture vigoureuse.
- Veiller à maintenir un feuillage vigoureux.

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

ANNABELLE

NICOLA X MONALISA




HZPC
keeps you growing

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation SOUTH EUROPE



Plantation

- ANNABELLE présente une dormance courte.
- Habituer les plants à la température ambiante avant plantation.
- Lors du dégermage, éviter la condensation sur les tubercules.
- Si un plant a de longs germes, dégermer et laisser sécher avant plantation.
- ANNABELLE réagit bien à la coupe de gros calibres. Il est conseillé de couper 3-4 semaines avant plantation.
- Couper entraîne un risque d'infection. Désinfecter le couteau et utiliser du talc. Sécher rapidement pour une bonne cicatrisation. Pour des climats plus froids, couper 3-4 semaines avant plantation.
- Le traitement des plants et/ou du sol est conseillé pour contrôler le rhizoctone, la gale argentée et d'autres maladies telluriques affectant la peau. Appliquer de l'azoxystrobine sur le sol donne de bons résultats sur beaucoup de champignons.
- ANNABELLE peut être cultivée sur tous types de sols.
- Nous recommandons de planter ANNABELLE 3 cm plus profond que la normale pour renforcer le système racinaire et l'assimilation des nutriments.




Culture

- Appliquer une dose initiale d'azote importante si le développement du feuillage est faible.
- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Pour une bonne efficacité, adapter la dose de métribuzine en fonction des conditions météo.
- ANNABELLE semble sensible au clomazone seul ou combiné à d'autres herbicides.
- Une culture irriguée produira une récolte plus uniforme et de meilleure qualité culinaire.
- Une surfertilisation en azote peut entraîner une plus grande sensibilité au mildiou.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou sur feuillage et tubercules.



Défanage et Récolte

- Viser une teneur en matière sèche de 18,5 %.
- Commencer le contrôle de la teneur en matière sèche environ 3 semaines avant la récolte.
- Conserver un sol frais et une irrigation régulière après défanage peut limiter les dégâts d'insectes sur les tubercules. Le roulage des buttes est également bénéfique.
- Pour éviter de hauts risques de pourriture, récolter de préférence quand la température du sol est inférieure à 25°C.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte.
- ANNABELLE est assez résistante aux coups bleus (sauf en conditions extrêmes).
- Des micro-dommages lors de la récolte provoqueront une augmentation de la déshydratation en stockage et une germination plus précoce.
- Les pommes de terre doivent être suffisamment sèches avant emballage. Les sacs Jumbo devraient avoir des bandes de ventilation pour aider à maintenir la qualité des récoltes.



Conservation

- La température recommandée pour un stockage temporaire est de 10°C.
- Le transport devrait être effectué en camion réfrigéré à une température de 10°C.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.