ANNABELLE

NICOLA X MONALISA

- **Ottimo sapore**
- **Polpa compatta**
- **Idonea per una raccolta precoce**
- **Uniformità di calibro e di forma dei tuberi**
- **Buona resistenza agli urti**

Caratteristiche agronomiche

Maturazione	76	Precoce
Durata della dormienza	28	Breve
Resa	90	Buona
Calibro del tubero	72	Picollo
Forma del tubero		Lunga-ovale
Numero di tuberi		12-14
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo intensa
Tipo di cottura		A - Soda
Sostanza secca/Amido		18,3% / 12,5%
Contenuto de sostanza se		331 / 1,07
Inbrunimento interno	4	Non sensibile
Sens. al Metribuzin	60	
Tuberomania	82	

Colore della pelle e pasta

Tipo di cottura

Maturazione

Densità di semina

Mercato: 35-55 mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila 75 cm	90 cm
28/35	60.000	22	19
35/45	52.000	26	21
45/55	40.000	33	28

Profondità di semina: 3 cm più in profondità del normale.
Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	32	
Peronospora del tubero	44	
Alternaria	60	
Scabbia comune	51	
Scabbia polverulenta	55	
Macchie intern.nematodi	90	
PVY	40	
Yntn tolleranza tubero	69	

Res. a nematodi

Ro1/4	9
Ro2/3	8
Ro5	*9
Pa2	*3
Pa3	

Res. a Rogna Nera

F1	10
F2	6
F6	7
F18	6

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Azoto (N): 110% in confronto con altre varietà a ciclo medio precoce.
- Sono consigliati i nutrienti a lento rilascio per consentire un lungo periodo di crescita.
- Applicare 2/3 prima della semina ed 1/3 alla rincalzatura.
- Non usare cloruro di potassio (KCl) prima di 6 settimane dalla semina. Applicazioni tardive possono determinare basso contenuto di sostanza secca.
- La concimazione organica aiuta a mantenere la coltura vigorosa.
- Mantenere il fogliame vigoroso.

L'uso di queste informazioni è sotto la responsabilità dell'utente che deve adattarle alla sua situazione. HZPC non si assume alcuna responsabilità. 27 Mag 2025
www.hzpc.com

ANNABELLE

NICOLA X MONALISA

Preparazione dei tuberi e semina

- ANNABELLE ha corta dormienza.
- Permettere al seme di acclimatarsi alle condizioni locali prima di piantare.
- Quando si tolgono i germogli, evitare la formazione di condensa sui tuberi.
- Nel caso di tuberi con germogli lunghi, rimuoverli e lasciare che i tuberi si asciughino prima di piantare.
- ANNABELLE reagisce bene al taglio di sementi dei tuberi di grosse dimensioni, il risultato ottimale si ottiene tagliando 3-4 settimane prima della semina.
- Il taglio aumenta il rischio di infezione. Disinfettare il coltello ed usare polvere di talco. Favorire una rapida essiccazione per la cicatrizzazione rapida. Nei climi più freddi attendere 3-4 settimane prima di piantare.
- Trattamenti ai tuberi e / o del terreno sono consigliati per controllare la Rhizoctonia, scabbia argentea e altri patogeni del terreno che possono danneggiare la buccia. L'applicazione di Azoxyistrobin al terreno dà buoni risultati su molti funghi.
- ANNABELLE può crescere in tutti i tipi di terreno.
- Piantare ANNABELLE 3 cm in profondità per avere un forte apparato radicale in grado di assorbire i nutrienti.



Coltivazione

- Lo sviluppo del fogliame è debole, applicare un alto dosaggio iniziale di azoto.
- L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un dosaggio inferiore.
- Le condizioni climatiche hanno una notevole influenza sull'efficacia del metribuzin, usare una dose adatta alle circostanze.
- ANNABELLE sembra essere sensibile al clomazone anche in combinazione con altri erbicidi.
- L'irrigazione garantisce un prodotto più uniforme con una migliore qualità di cottura.
- L'eccessiva disponibilità di azoto determina un aumento della suscettibilità alla peronospora.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni sia al fogliame che sui tuberi.

Maturazione e raccolta

- Cercare di ottenere un contenuto di sostanza secca del 19 %.
- Iniziare a misurare il contenuto di sostanza secca tre settimane prima dalla presunta data di raccolta.
- Fare molta attenzione al momento della bruciatura degli steli per avere la qualità di cottura dei tuberi desiderata.
- Per una dormienza ottimale, la bruciatura del fogliame deve essere fatta sulla coltura in piena maturazione.
- La buccia deve essere completamente formata prima della raccolta.
- ANNABELLE è abbastanza resistente agli urti, a meno che non si verifichino condizioni estreme.
- Micro lesioni da raccolta causano disidratazione ed una precoce germogliazione dei tuberi.



Conservazione

- ANNABELLE è una varietà precoce e quindi le vendite avvengono entro 5 mesi dopo la raccolta.
- Per una conservazione di 3 mesi, è richiesta la refrigerazione.
- Prevenire la disidratazione, facendo in modo che la differenza tra l'aria di raffreddamento e la temperatura del prodotto non sia elevata.
- Ventilare regolarmente, ma per tempi brevi, per evitare l'accumulo di CO_2.
- Qualsiasi variazione di temperatura, combinata con la presenza di condensa, può portare ad una germinazione precoce e a un elevato rischio di scabbia argentea.

L'uso di queste informazioni è sotto la responsabilità dell'utente che deve adattarle alla sua situazione. HZPC non si assume alcuna responsabilità. 27 Mag 2025
www.hzpc.com