



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk CHAIR FERME

- Zeer geschikt voor vroege teelt
- Vastkokend
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Zeer goede smaak



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	76	Vroeg
Kiemrust	28	Kort
Opbrengst rijp	90	Redelijk
Grofheid	72	Fijn
Knolvorm		Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Donkergeel
Kooktype		A - Vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,3% / 12,5%
OWG/Soortelijk gewicht		331 / 1,07
Blauwgevoeligheid	4	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	60	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	82	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/30	55.000	24	20
30/40	50.000	27	22
40/45	45.000	28	23
45/50	38.000	35	29
28/32	55.000	24	20
32/45	47.500	25	21
32/50	43.000	31	26

Resistenties

Phytophthora loof	32	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	44	● ● ● ● ●
Alternaria	60	● ● ● ● ●
Schurft	51	● ● ● ● ●
Poederschurft	55	● ● ● ● ●
Kringerigheid	90	● ● ● ● ●
Y-virus	40	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	69	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	8	● ● ● ● ●
Ro5	*9	● ● ● ● ●
Pa2	*3	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	7	● ● ● ● ●
F18	6	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Langzaam vrijkomende meststoffen worden aanbevolen om een langer groeiseizoen te creëren.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk CHAIR FERME



Voorbehandeling en poten

- ANNABELLE heeft een korte kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Behandel ANNABELLE pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.




Teelt

- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.
- Te veel beregenen laat in het seizoen, vergroot de kans op dominante lenticellen.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- ANNABELLE is vatbaar voor knolsymptomen van Yntn-virus.



Loofdoding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 305 gram.
- Start ca. 3 weken voor de verwachte oogstdatum met het meten van het drogestofgehalte.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Minimaal 3 weken tussen lofdding en rooien voor een goede huidvastheid.
- ANNABELLE is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden gerooid wordt.
- Kleine beschadiging bij de oogst heeft uitdroging en vroege kieming tot gevolg.



Bewaring

- ANNABELLE is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.
- Bewaar temperatuur: 4 °C.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverscurft.