



Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië SALAD

- Zeer goede smaak
- Vastkokend
- Zeer mooie heldere schil
- Hoog knolaantal
- Vroeg huidvast



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	76	Vroeg
Kiemrust	28	Kort
Opbrengst rijp	90	Redelijk
Grofheid	72	Fijn
Knolvorm		Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Donkergeel
Kooktype		A - Vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,3% / 12,5%
OWG/Soortelijk gewicht		331 / 1,07
Blauwgevoeligheid	4	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	60	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	82	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

		Rijfstand
Maat	Knollen/ha	75 cm 90 cm

Resistenties

Phytophthora loof	32	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	44	● ● ● ● ●
Alternaria	60	● ● ● ● ●
Schurft	51	● ● ● ● ●
Poederschurft	55	● ● ● ● ●
Kringerigheid	90	● ● ● ● ●
Y-virus	40	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	69	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	8	● ● ● ● ●
Ro5	*9	● ● ● ● ●
Pa2	*3	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	7	● ● ● ● ●
F18	6	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Nutrient Management Gids (RB209), Groep 1
- N-gift: 110% vergeleken met andere middenvroeg rassen.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië SALAD



Voorbehandeling en poten

- ANNABELLE heeft een korte kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.
- Plant ANNABELLE 3 cm dieper voor een sterk ontwikkeld wortelgestel en betere mineralenopname.
- Volg de geadviseerde plantafstanden op; ANNABELLE geeft een hoog aantal knollen per plant.




Teelt

- Zwakke loofontwikkeling. Een hoge dosis stikstof wordt aangeraden.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.
- Een te hoge stikstofgift heeft een hogere gevoeligheid voor Phytophthora tot gevolg.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.



Loofddoding en oogst

- Het moment van loofddoding is belangrijk voor de optimale kookkwaliteit.
- Voor een optimale kiemrust moet loofddoding plaatsvinden bij een afgerijpt gewas.
- Wees alert, knollen groeien snel uit de maat.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- ANNABELLE is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden geroid wordt.
- Kleine beschadiging bij de oogst heeft uitdroging en vroege kieming tot gevolg.



Bewaring

- Voor bewaring langer dan 3 maanden is mechanische koeling vereist.
- MECHANISCHE KOELING
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO₂-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.