# ANNABELLE

NICOLA X MONALISA

## Produção de batata de consumo France CHAIR FERME

- **Muito apropriada para uma colheita precoce**
- **Cozedura firme**
- **Calibre e forma dos tubérculos uniformes**
- **Sabor muito bom**

## Propriedades agronómicas

| | | |
|---|---|---|
| Maturação | 76 | Precoce |
| Periodo de dormencia | 28 | Curto |
| Produto final maturação | 90 | Moderado |
| Tamanho tubérculos | 72 | Pequeno |
| Forma dos tubérculos | | Alongada-oval |
| Numero de tubérculos | | 12-14 |
| Cor da pele | | Amarela |
| Polpa após cozinhar | | Amarela escura |
| Tipo culinário | | A - Firme |
| Peso de matéria seca/Aln | | 18,3% / 12,5% |
| Teor de matéria seca/Pes | | 331 / 1,07 |
| Enegrecimento interno | 4 | Não sensível |
| Sens. ao Metribuzin | 60 | |
| Formacao de Batatinhas | 82 | |



Cor da pele e carne

Tipo culinário

Maturação

## Densidade de Plantação

| Calibre | Densidade de plantação/ha | Distancia entre linhas 75 cm | 90 cm |
|---|---|---|---|
| 28/30 | 55.000 | 24 | 20 |
| 30/40 | 50.000 | 27 | 22 |
| 40/45 | 45.000 | 28 | 23 |
| 45/50 | 38.000 | 35 | 29 |
| 28/32 | 55.000 | 24 | 20 |
| 32/45 | 47.500 | 25 | 21 |
| 32/50 | 43.000 | 31 | 26 |

## Resistências

| | | |
|---|---|---|
| Mildio da folha | 32 | |
| Mildio do tuberculo | 44 | |
| Alternaria | 60 | |
| Sarna comum | 51 | |
| Sarna pulvurolenta | 55 | |
| Spraing | 90 | |
| PVY | 40 | |
| Yntn tolerancia tubérculos | 69 | |

Res. aos nematodos

| | | |
|---|---|---|
| Ro1/4 | 9 | |
| Ro2/3 | 8 | |
| Ro5 | *9 | |
| Pa2 | *3 | |
| Pa3 | | |

Res. verruga

| | | |
|---|---|---|
| F1 | 10 | |
| F2 | 6 | |
| F6 | 7 | |
| F18 | 6 | |

* HZPC own analysis/no official analysis

## Fertelização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
- Consulte sempre as regras locais atuais sobre a fertilização das culturas.
- Aconselha-se a utilização de nutrientes de libertação lenta para manter um período de crescimento mais longo.
- Azoto (N): Aplicação elevada (210-250Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
- Não aplicar Potássio Clorídrico (KCl) menos de 6 semanas antes da plantação, aplicações tardias podem induzir níveis mais baixos de matéria seca.
- O Manganês e o Magnésio fortalecem a folhagem e previnem a morte prematura.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 27 Mai 2025

**www.hzpc.com**

**Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com**

# ANNABELLE

NICOLA X MONALISA

## Produção de batata de consumo France CHAIR FERME



### Preparação e Plantação

- ANNABELLE tem uma dormência curta.
- Permitir que a semente se adapte às condições locais antes da plantação.
- Tratar sempre as sementes de ANNABELLE e o solo contra Rhizoctonia.

### Cultivo

- Recomenda-se a utilização de Metribuzina em pré-emergência. Em caso de pós-emergência, utilizar doses mais baixas.
- "As condições climatéricas têm uma forte influência no efeito da Metribuzina
- Irrigação resulta num produto mais uniforme e com melhor qualidade culinária.
- A irrigação excessiva na parte final da cultura aumenta a dominância de lenticelas.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha e do tubérculo.
- ANNABELLE é suscetível ao vírus Yntn, pelo que se deve utilizar um forte controlo de afídeos.



### Defenagem e Colheita

- Para obter teor de matéria seca de 17%.
- Começar testes do teor de matéria seca cerca de 3 semanas antes da data prevista do arranque.
- A pele deve estar firme antes do arranque.
- Mínimo de 3 semanas entre a desecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.
- ANNABELLE é muito resistente a golpes, exceto em condições extremas.
- Pancadas no arranque resultam em desidratação e abrolhamento precoce.



### Armazenamento

- ANNABELLE é uma variedade precoce, pelo que a sua comercialização ocorre normalmente nos 5 meses subsequentes à sua colheita.
- Temperatura de armazenamento: 4 ºC.
- Uma temperatura estável durante o armazenamento previne o desenvolvimento de sarna prateada.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 27 Mai 2025

**www.hzpc.com**

**Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com**