




Teeltadvies Consumptieteelt FRENCH FRIES

- Hoge opbrengst
- Sterk loof
- Veelzijdig ras



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	54	Laat
Opbrengst groen	111	Hoog
Kiemrust	50	Vrij kort
Opbrengst rijp	110	Hoog
Grofheid	80	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Rood
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		23,3% / 17,4%
OWG/Soortelijk gewicht		433 / 1,094
Blauwgevoeligheid	13	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	63	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	85	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/50	34.000	39	33
50/60 gesneden	36.000	37	31

Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.

Resistenties

Phytophthora loof	40	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	73	● ● ● ● ●
Alternaria	77	● ● ● ● ●
Schurft	56	● ● ● ● ●
Poederschurft	59	● ● ● ● ●
Kringerigheid	89	● ● ● ● ●
Y-virus	17	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	97	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*3	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*2	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	7	● ● ● ● ●
F6	7	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Op kali-arme gronden chloorhoudende kali (KCl) net voor het planten toedienen om stootblauw te voorkomen.
- Om een hoog drogestofgehalte te vermijden, is een extra toepassing van kalium nodig na de knolzetting.
- Fosfaat (P) : volgens standaard advies.
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt FRENCH FRIES




Voorbehandeling en poten

- ASTERIX heeft een gemiddelde kiemrust.
- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- ASTERIX is geschikt voor alle grondsoorten.
- Wanneer geplant wordt op zware kleigrond, is een goede structuur cruciaal.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.




Teelt

- Loofontwikkeling is goed, houd de hoeveelheid stikstof laag.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- ASTERIX heeft een goede droogtetolerantie.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- ASTERIX heeft een hoge resistentie tegen TRV.



Loofdding en oogst

- Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst.
- De knollen zijn grof. Voorzichtig rooien en bewaren om beschadiging te voorkomen.



Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8 °C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO₂-ophoping te voorkomen.
- ASTERIX is gevoelig voor schilbrand. Zorg voor een goede afharding voordat een kiemremmer wordt toegepast.
- Gebruik de hoogste dosis kiemremmer bij de eerste behandeling.