AURUM

SYLVANA X VOYAGER

Anbauempfehlung Speisekartoffeln United Kingdom MAINCROP BAKER

- **Sehr robuste Sorte**
- **Gute Speisequalität**
- **Hoher Trockenstoffgehalt**
- **Geeignet für Bratkartoffeln und "Haus-Pommes"**
- **Gute Schorf- und Pulverschorfresistenz**

Sorteneigenschaften

Reifezeit	62	Mittelspät
Keimruhe	63	Mittel
Ertrag	107	Hoch
Sortierung	82	Großfallend
Knollenform		Rund-oval / Oval
Knollenzahl		12-14
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		19,2% / 13,4%
UWG/Spez. Gewicht		350 / 1,074
Blaufleckigkeit	10	Wenig empfindlich
Metribuzin Empf.	62	
Knöllchensucht	90	

Schalen und Fleischfarbe

Kochtyp

Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 40-85 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand 75 cm	Reihenabstand 90 cm

Resistenz

Krautfäule	53
Knollenfäule	57
Alternaria	78
Schorf	65
Pulverschorf	67
Eisenfleckigkeit	93
Y-Virus	21
Yntn Knollentoleranz	99

Nematodenresist.

Ro1/4	9	F1	10	
Ro2/3		F2	*5	
Ro5		F6	*1	
Pa2	4	F18	*5	
Pa3				

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
-
- Die Stickstoffgabe sollte zum 2/3 vor dem Pflanzen und zum 1/3 nach dem Knollenansatz erfolgen.
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 28 Nov 2025
www.hzpc.com

AURUM

SYLVANA X VOYAGER

Anbauempfehlung Speisekartoffeln United Kingdom MAINCROP BAKER



Vorbereitung und Pflanzung

- AURUM hat eine mittlere Keimruhe.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen an den örtlichen Gegebenheiten akklimatisieren.
- AURUM Pflanzgut und Boden immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Für eine Langzeitlagerung sind Knollenbehandlungen gegen Silberschorf empfehlenswert.
- Die beste Qualität wird auf fruchtbaren und leichten Böden erreicht.
- In einen warmen Boden pflanzen, nicht zu früh.

Anbau

- AURUM hat eine langsamere Entwicklung, aber später entwickelt sich ein kräftiges Gewächs.
- Die Anwendung von Metribuzin wird im Vorauflauf empfohlen. Im Nachauflauf sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- Wegen der hohen Qualitätsanforderungen wird eine Bewässerung dringend empfohlen.
- Produkte mit Wirkung auf Alternaria Solani und Alternaria Alternata verwenden.
- Hat eine gute Krautfäuleresistenz, normale Behandlung während der langen Wachstumszeit wird empfohlen.



Krautregulierung und Ernte

- Für eine optimale Keimruhe sollte der Bestand bei der Krautregulierung schon in der Abreife sein.
- Eine Krautregulierung auf einem noch grünen Bestand, führt zu einer hellen Schale.
- Lossschaligkeit hat einen negativen Einfluss auf die Lagerfähigkeit.
- Um die helle und glatte Schale zu erhalten, sollte die Verweildauer im Boden nach der Krautregulierung kurz gehalten werden.



Lagerung

- Bei einer Ernte unter guten Bedingungen kann mit der Kühlung nach der ersten Wundheilung schnell begonnen werden.
- Lagertemperatur: 3 °C.
- Eine stabile Temperatur während der Lagerung beugt der Entwicklung von Silberschorf vor.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 28 Nov 2025
www.hzpc.com

- **Gute Resistenz gegen Krautfäule**