



Producción de consumo United Kingdom MAINCROP BAKER

- Piel brillante muy atractiva
- Buena calidad culinaria
- Buen contenido de materia seca
- Apropiaada para hacer patatas fritas caseras
- Buena resistencia a la sarna común y la sarna pulverulenta



Propiedades agronómicas

Maduración	62	Semi- tardia
Período de dormencia	63	Medio
Producción	107	Alta
Tamaño del tuberculo	82	Calibre grande
Forma		Redonda-oval / Oval
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		19,2% / 13,4%
/Peso específico		350 / 1,074
Golpeo interno	10	Algo sensible
Sens. Metribuzin	62	●●●●●
Fenómeno patatitas	90	●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-85 mm.

	Distancia entre caballones
Calibre	Densidad de plantación/ha
	75 cm 90 cm

Resistencias

Mildiú en planta	53	●●●●●
Mildiú en el tubérculo	57	●●●●●
Alternaria	78	●●●●●
Sarna común	65	●●●●●
Sarna verrugosa	67	●●●●●
Spraing	93	●●●●●
Virus Y	21	●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	99	●●●●●

Res. a nemátodos

Ro1/4	9	●●●●●
Ro2/3		●●●●●
Ro5		●●●●●
Pa2	4	●●●●●
Pa3		●●●●●

Roña

F1	10	●●●●●
F2	*5	●●●●●
F6	*1	●●●●●
F18	*5	●●●●●

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial



Producción de consumo United Kingdom MAINCROP BAKER



Cultivo

- AURUM tiene una dormencia media.
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales.
- Tratar siempre la semilla de AURUM y el suelo contra rizoctonia.
- Para almacenamientos largos, se aconsejan tratamientos en los tubérculos para controlar la sarna plateada. Se puede utilizar Azoxystrobin.
- La mejor calidad se obtiene en terrenos fértiles y ligeros.
- Plantar en terrenos cálidos, no plantar demasiado pronto.




Período de cultivo

- AURUM tiene una emergencia lenta, pero más tarde el follaje dará lugar a una planta fuerte.
- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- Es muy recomendable el riego para asegurar una calidad superior.
- Usar productos que tengan efecto en Alternaria solani y Alternaria alternata.
- A pesar de su buena resistencia contra Phytophthora, se aconsejan aplicaciones preventivas en ciclos de cultivo largos.



Destrucción de las plantas

- Para conseguir una dormencia óptima, se debe destruir la planta cuando esté madura.
- La destrucción de la planta con el follaje algo verde, dará lugar a una piel más brillante.
- Una piel no fijada afectará negativamente el almacenamiento.
- Para mantener una piel brillante y suave, no se deben dejar los tubérculos demasiado tiempo en el suelo después de la destrucción de la planta.



Almacenamiento

- Una cosecha recolectada en buenas condiciones se puede enfriar rápidamente después de la primera cura.
- Temperatura de almacenamiento: 3 °C.
- Unas temperaturas estables durante el almacenamiento evitan el desarrollo de sarna plateada.

- Buena resistencia al mildiu

