



United Kingdom MAINCROP BAKER

- **Buccia lucente, molto invitante**
- **Buona qualità di cottura**
- **Buon contenuto di sostanza secca**
- **Idonea per la frittura a casa**
- **Buona resistenza a scabbia polverulenta e scabbia comune**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	62	Medio-tardiva
Durata della dormienza	63	Moderata
Resa	107	Alta
Calibro del tubero	82	Grosso
Forma del tubero		Tonda-ovale / Ovale
Numero di tuberi		12-14
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo
Tipo di cottura		AB - Quasi Soda
Sostanza secca/Amido		19,2% / 13,4%
Contenuto de sostanza se		350 / 1,074
Inbrunimento interno	10	Qualcosa sensibile
Sens. al Metribuzin	62	●●●●●
Tuberomania	90	●●●●●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Mercato: 40-85 mm.

		Distanza tra le fila	
Calibro	Densità di semina/ha	75 cm	90 cm

Resistenze

Peronospora fogliame	53	●●●●●
Peronospora del tubero	57	●●●●●
Alternaria	78	●●●●●
Scabbia comune	65	●●●●●
Scabbia polverulenta	67	●●●●●
Macchie intern.nematodi	93	●●●●●
PVY	21	●●●●●
Yntn tolleranza tubero	99	●●●●●

Res. a nematodi

Ro1/4	9	●●●●●
Ro2/3		●●●●●
Ro5		●●●●●
Pa2	4	●●●●●
Pa3		●●●●●

Res. a Rogna Nera

F1	10	●●●●●
F2	*5	●●●●●
F6	*1	●●●●●
F18	*5	●●●●●


Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
-
- Applicare 2/3 prima della semina ed 1/3 alla rincalzatura.
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale



United Kingdom MAINCROP BAKER



Preparazione dei tuberi e semina

- AURUM ha media dormienza.
- Permettere al seme di acclimatarsi alle condizioni locali prima di piantare.
- Trattare sempre tuberi-seme di AURUM e terreno contro la Rhizoctonia.
- Per la lunga conservazione dei tuberi sono necessari trattamenti per controllare la scabbia argentea. Azoxystrobin può essere utilizzato alla semina.
- La migliore qualità può essere ottenuta in terreni fertili e leggeri.
- Piantare in terreni caldi, non piantare troppo presto.




Coltivazione

- AURUM ha emergenza lenta, successivamente il fogliame si svilupperà dando origine ad una pianta robusta.
- L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un dosaggio inferiore.
- Per mantenere elevati standard di qualità, la gestione dell'irrigazione è importantissima.
- Usare principi attivi che siano efficaci contro Alternaria solani e Alternaria alternata.
- Nonostante la buona resistenza alla Phytophthora, un trattamento preventivo regolare è consigliato data la lunga stagione di crescita.



Maturazione e raccolta

- Per una dormienza ottimale, la bruciatura del fogliame deve essere fatta sulla coltura in piena maturazione.
- Disseccare il fogliame quando è ancora verde comporterà una buccia più lucente.
- Una buccia non completamente matura ha un effetto negativo sulla conservabilità.
- Per mantenere una buccia lucente e liscia, i tuberi non devono essere lasciati troppo a lungo nel terreno dopo la bruciatura del fogliame.



Conservazione

- Il prodotto raccolto in buone condizioni può essere raffreddato rapidamente dopo la prima fase di maturazione.
- Temperatura di conservazione: 3 °C.
- Una temperatura stabile durante la conservazione previene lo sviluppo della scabbia argentea.

- Buona resistenza alla peronospora

