



Producción de consumo TRADITIONAL FRESH

- Tubérculos grandes
- Tubérculo de calibre y forma uniformes
- Elevada producción



Propiedades agronómicas

Maduración	54	Tardia
Producción	129	Muy alta
Período de dormencia	59	Medio
Producción	125	Muy alta
Tamaño del tuberculo	87	Muy grandes
Forma		Redonda-oval / Oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Roja
Color carne cocinar		Amarilla clara
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		18,5% / 12,7%
/Peso específico		336 / 1,071
Golpeo interno	14	Bastante sensible
Sens. Metribuzin	80	●●●●●●●●
Fenómeno patatitas	77	●●●●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	51.000	26	22
35/45	48.000	28	23
35/55	46.000	29	24
50/55	40.000	33	28
55/65	40.000	33	28

Resistencias

Mildiú en planta	55	●●●●●●●●
Mildiú en el tubérculo	47	●●●●●●●●
Alternaria	74	●●●●●●●●
Sarna común	52	●●●●●●●●
Sarna verrugosa	58	●●●●●●●●
Spraing	92	●●●●●●●●
Virus Y	28	●●●●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	99	●●●●●●●●

Res. a nemátodos	Roña
Ro1/4 *2 ●●●●●●●●	F1 10 ●●●●●●●●
Ro2/3 *2 ●●●●●●●●	F2 ●●●●●●●●
Ro5 *2 ●●●●●●●●	F6 ●●●●●●●●
Pa2 *5 ●●●●●●●●	F18 ●●●●●●●●
Pa3 *2 ●●●●●●●●	

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Consulte siempre las normas locales vigentes sobre fertilización de cultivos.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.
- Prestar atención a la cantidad de abono orgánico para evitar mineralizaciones posteriores.



Producción de consumo TRADITIONAL FRESH



Cultivo

- La dormencia es de media a larga, por lo tanto no es necesario aplicar calor.
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.




Período de cultivo

- La tuberización es temprana.
- La emergencia es algo lenta, más tarde la planta se desarrolla bien.
- BARTINA tiene una buena tolerancia a metribuzin.
- Intentar mantener una buena humedad en el terreno para prevenir la sarna común.
- Cuando hay riesgo de sarna común, regar el cultivo al inicio de la tuberización.
- Utilizar tratamientos estrictos contra Phytophthora, ya que es muy susceptible en planta y tubérculo.



Dstrucción de las plantas

- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha.
- Los tubérculos son de gran calibre. Cosechar y almacenar con cuidado para evitar daños y golpes.



Almacenamiento

- BARTINA no es apropiada para almacenamientos largos.
- Tener cuidado con el período de curación de las heridas.