



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Hoge opbrengst



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	54	Laat
Kiemrust	59	Gemiddeld
Opbrengst groen	129	Zeer hoog
Opbrengst rijp	125	Zeer hoog
Grofheid	87	Zeer grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Rood
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,5% / 12,7%
OWG/Soortelijk gewicht		336 / 1,071
Blauwgevoeligheid	14	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	80	●●●●●○
Onderzeeërvorming	77	●●●●●○



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	51.000	26	22
35/45	48.000	28	23
35/55	46.000	29	24
50/55	40.000	33	28
55/65	40.000	33	28

Resistenties

Phytophthora loof	55	●●●●●○
Phytophthora knol	47	●●●●●○
Alternaria	74	●●●●●○
Schurft	52	●●●●●○
Poederschurft	58	●●●●●○
Kringerigheid	92	●●●●●●
Y-virus	28	●●●●●○
Yntn-virus knoltolerantie	99	●●●●●●
Aardappelmoetheid		
Ro1/4 *2	●●●●●○	
Ro2/3 *2	●●●●●○	
Ro5 *2	●●●●●○	
Pa2 *5	●●●●●○	
Pa3 *2	●●●●●○	
Wratziekte		
F1 10	●●●●●●	
F2	●●●●●○	
F6	●●●●●○	
F18	●●●●●○	

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- De kiemrust is middellang, een warmtestoot is niet noodzakelijk.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone schurft.




Teelt

- BARTINA heeft een vroege knolzetting.
- De opkomst is een beetje traag, later ontwikkelt het loof zich goed.
- BARTINA heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- Zorg voor een goede vochtvoorziening om gewone schurft te voorkomen.
- In geval van risico op gewone schurft, heeft beregenen tijdens knolzetting de voorkeur.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.



Loofdoding en oogst

- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.



Bewaring

- BARTINA is niet geschikt voor een lange bewaring.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.