




Anbauempfehlung Speisekartoffeln France

- Großfallend
- Gleichmäßige Sortierung und Knollenform
- Hoher Ertrag
- Gute Trocken- und Hitzeresistenz
- Gute Lagerfähigkeit



Sorteneigenschaften

Reifezeit	53	Spät
Keimruhe	70	Lang
Ertrag	103	Ziemlich hoch
Sortierung	85	Großfallend
Knollenform		Oval / Langoval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		B - Vorwiegend Mehlig
TS/Stärke %		20,9% / 15,1%
UWG/Spez. Gewicht		385 / 1,083
Blaufleckigkeit	17	Empfindlich
Metribuzin Empf.	60	●●●●●
Knöllchensucht	60	●●●●●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/45	40 000	33	28
45/50	35.000	38	32
50/55	32 000	42	35

Resistenz

Krautfäule	47	●●●●●
Knollenfäule	71	●●●●●
Alternaria	80	●●●●●
Schorf	46	●●●●●
Pulverschorf	56	●●●●●
Eisenfleckigkeit	77	●●●●●
Y-Virus	60	●●●●●
Yntn Knollentoleranz	38	●●●●●

Nematodenresist.

Ro1/4	9	●●●●●	F1	10	●●●●●
Ro2/3	*1	●●●●●	F2	*2	●●●●●
Ro5	*1	●●●●●	F6		●●●●●
Pa2	*2	●●●●●	F18		●●●●●
Pa3		●●●●●			

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Beachten Sie immer die örtlichen und aktuellen Regelungen zur Pflanzendüngung.
- Die Stickstoffgabe sollte zum 4/5 vor und zum 1/5 nach der Pflanzung erfolgen.
- Stickstoff (N): Hoher Bedarf (210-250kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.
- Keinen organischen Dünger anwenden.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France



Vorbereitung und Pflanzung

- Nicht abkeimen, damit werden Auflaufprobleme verhindert.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- CAESAR Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Nicht in kalte Böden pflanzen, um einen unregelmäßigen Auflauf zu verhindern.




Anbau

- CAESAR hat eine langsamere Entwicklung, aber später entwickelt sich ein kräftiges Gewächs.
- CAESAR hat einen frühen Knollenansatz bei später Reifezeit
- Eine vorbeugende Behandlung gegen Phytophthora wird empfohlen.
- CAESAR ist anfällig gegen Yntn-Virus, daher ist eine konsequent durchgeführte Blattlausbekämpfung wichtig.



Krautregulierung und Ernte

- Ziel ist ein UWG von 325 Gramm.
- CAESAR kann nach 120 Tagen geerntet werden.
- Die Knollen sollten vor der Ernte komplett schalenfest sein.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.
- CAESAR ist mittelfällig für Blaufleckigkeit, daher Fallhöhen reduzieren und mechanische Beschädigungen vermeiden.
- Ein hohes UWG und Kälte während der Ernte erhöhen das Risiko auf Blaufleckigkeit.
- Achten Sie besonders auf die Vermeidung von mechanischen Beschädigungen, um einer späteren Fusarium-Infektion vorzubeugen.



Lagerung

- CAESAR hat eine lange Keimruhe und eine gute Lagerfähigkeit.
- Eine Fusariumbehandlung wird empfohlen, um die Lagerkrankheiten zu vermeiden.
- Lagertemperatur: 4 °C.
- Vor dem Abpacken die Knollen erwärmen, um eine interne stabile Temperatur zwischen 10 und 12 Grad zu erreichen.