




Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Grove knollen
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Hoge opbrengst
- Goede droogte- en hittetolerantie
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

| | | |
|------------------------|-----|--------------------|
| Rijptijd | 53 | Laat |
| Kiemrust | 70 | Lang |
| Opbrengst rijp | 103 | Vrij hoog |
| Grofheid | 85 | Grof |
| Knolvorm | | Ovaal / Lang-ovaal |
| Knolaantal | | 9-11 |
| Schilkleur | | Geel |
| Vleeskleur na koken | | Licht geel |
| Kooktype | | B - iets kruimig |
| Droge stof/Zetmeel % | | 20,9% / 15,1% |
| OWG/Soortelijk gewicht | | 385 / 1,083 |
| Blauwgevoeligheid | 17 | Gevoelig |
| Sencor gevoeligheid | 60 | ●●●●●● |
| Onderzeeërvorming | 60 | ●●●●●● |



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

| Maat | Knollen/ha | Rijfstand | |
|-------|------------|-----------|-------|
| | | 75 cm | 90 cm |
| 28/35 | 50.000 | 27 | 22 |
| 35/45 | 40.000 | 33 | 28 |
| 45/50 | 35.000 | 38 | 32 |
| 50/55 | 32.000 | 42 | 35 |

Resistenties

| | | |
|---------------------------|----|--------|
| Phytophthora loof | 47 | ●●●●●● |
| Phytophthora knol | 71 | ●●●●●● |
| Alternaria | 80 | ●●●●●● |
| Schurft | 46 | ●●●●●● |
| Poederschurft | 56 | ●●●●●● |
| Kringerigheid | 77 | ●●●●●● |
| Y-virus | 60 | ●●●●●● |
| Yntn-virus knoltolerantie | 38 | ●●●●●● |
| Aardappelmoetheid | | |
| Ro1/4 9 | | ●●●●●● |
| Ro2/3 *1 | | ●●●●●● |
| Ro5 *1 | | ●●●●●● |
| Pa2 *2 | | ●●●●●● |
| Pa3 | | ●●●●●● |
| Wratziekte | | |
| F1 10 | | ●●●●●● |
| F2 *2 | | ●●●●●● |
| F6 | | ●●●●●● |
| F18 | | ●●●●●● |

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Gebruik geen organische bemesting.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- Niet afkiemen i.v.m. opkomstproblemen.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel CAESAR pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- Niet planten in koude grond, dit geeft een verhoogd risico op een onregelmatige opkomst.




Teelt

- CAESAR heeft een trage opkomst maar het loof ontwikkelt zich sterk in een later stadium.
- Ondanks de late rijptijd, heeft CAESAR een vroege knolzetting.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
- CAESAR is vatbaar voor knolsymptomen van Yntn-virus.



Loofdoding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 325 gram.
- CAESAR kan geoogst worden na 120 dagen.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Minimaal 3 weken tussen lofding en rooien voor een goede huidvastheid.
- CAESAR is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Een hoog drogestofgehalte en koude omstandigheden tijdens de oogst verhogen de kans op stootblauw.
- Beperk zoveel mogelijk mechanische beschadiging om Fusarium te voorkomen.



Bewaring

- CAESAR heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Behandeling met Imazalil tegen bewaarziekten wordt geadviseerd.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Vóór verpakken: de aardappelen opwarmen tot 10-12 graden.