




Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië RETAIL FRESH

- Grove knollen
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Hoge opbrengst
- Goede droogte- en hittetolerantie
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	53	Laat
Kiemrust	70	Lang
Opbrengst rijp	103	Vrij hoog
Grofheid	85	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		20,9% / 15,1%
OWG/Soortelijk gewicht		385 / 1,083
Blauwgevoeligheid	17	Gevoelig
Sencor gevoeligheid	60	●●●●●●
Onderzeeërvorming	60	●●●●●●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	53.000	25	21
35/50	40.000	33	28
50/60	37.000	36	30

Resistenties

Phytophthora loof	47	●●●●●●
Phytophthora knol	71	●●●●●●
Alternaria	80	●●●●●●
Schurft	46	●●●●●●
Poederschurft	56	●●●●●●
Kringerigheid	77	●●●●●●
Y-virus	60	●●●●●●
Yntn-virus knoltolerantie	38	●●●●●●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	●●●●●●
Ro2/3	*1	●●●●●●
Ro5	*1	●●●●●●
Pa2	*2	●●●●●●
Pa3		●●●●●●

Wratziekte

F1	10	●●●●●●
F2	*2	●●●●●●
F6		●●●●●●
F18		●●●●●●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Nutrient Management Gids (RB209), Groep 3
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Fosfaat (P) : volgens standaard advies.
- Gebruik geen organische bemesting.



Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië RETAIL FRESH



Voorbehandeling en poten

- Bewaar het pootgoed niet kouder dan 5 °C. Warm voldoende op voor het poten.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Snijd de aardappels niet, de ogen zijn ongelijk verdeeld.
- Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.
- Niet planten in koude grond, dit geeft een verhoogd risico op een onregelmatige opkomst.




Teelt

- CAESAR heeft een trage opkomst maar het loof ontwikkelt zich sterk in een later stadium.
- Ondanks de late rijptijd, heeft CAESAR een vroege knolzetting.
- Zorg voor een goede vochtvoorziening om gewone schurft te voorkomen.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
- Ondanks de hoge resistentie tegen Phytophthora is een preventieve behandeling gewenst, vanwege het lange groeiseizoen.



Loofdding en oogst

- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- CAESAR is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Een hoog drogestofgehalte en koude omstandigheden tijdens de oogst verhogen de kans op stootblauw.
- Beperk zoveel mogelijk mechanische beschadiging om Fusarium te voorkomen.



Bewaring

- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Geschikt voor lange bewaring.
- CAESAR is licht gevoelig voor Phoma. Let op de wondheling. Een snelle temperatuuurdaling verhoogt het risico op Phoma.
- Voor bewaring langer dan 4 maanden is mechanische koeling vereist.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 5°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO₂-ophoping te voorkomen.