




Anbauempfehlung Speisekartoffeln France

- Gleichmäßige Sortierung und Knollenform
- Hoher Ertrag
- Vielseitige Sorte
- Gute Schorfresistenz
- Gut geeignet für die Langzeitlagerung



Sorteneigenschaften

Reifezeit	67	Mittelfrüh
Keimruhe	102	Sehr lang
Ertrag	108	Hoch
Sortierung	84	Großfallend
Knollenform		Rund-oval / Oval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Dunkelgelb
Fleischfarbe kochen		Dunkelgelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		18,3% / 12,5%
UWG/Spez. Gewicht		331 / 1,07
Blaufleckigkeit	10	Wenig empfindlich
Metribuzin Empf.	79	●●●●●○
Knöllchensucht	87	●●●●●●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 40-70 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	47 500	28	23
35/50	42 000	32	26
50/55	37.000	36	30

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	57	●●●●●○
Knollenfäule	71	●●●●●○
Alternaria	70	●●●●●○
Schorf	64	●●●●●○
Pulverschorf	68	●●●●●○
Eisenfleckigkeit	99	●●●●●●
Y-Virus	98	●●●●●●
Yntn Knollentoleranz	99	●●●●●●

Nematodenresist.

Ro1/4	9	●●●●●●	F1	10	●●●●●●
Ro2/3	4	●●●●●○	F2	*5	●●●●●○
Ro5	*6	●●●●●○	F6	*5	●●●●●○
Pa2		○●○●○●	F18	*1	●○●○●○
Pa3		○●○●○●			

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Beachten Sie immer die örtlichen und aktuellen Regelungen zur Pflanzendüngung.
- Stickstoff (N): Mittlerer Bedarf (170-210kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France



Vorbereitung und Pflanzung

- CAMELIA hat eine sehr lange Keimruhe.
- Die Pflanzkartoffeln nicht bei Temperaturen unter 5 °C lagern. Vor dem Pflanzen ausreichend aufwärmen.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- Wärmebehandlung: mindestens 3 Wochen.
- CAMELIA Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Ist geeignet für alle Bodenarten.
- Ein guter Dammaufbau ist erwünscht, um grüne Knollen vorzubeugen.




Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- Die Anwendung von Metribuzin wird im Voraufbau empfohlen. Im Nachaufbau sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- Produkte mit Wirkung auf Alternaria Solani und Alternaria Alternata verwenden.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.



Krautregulierung und Ernte

- Bitte beachten Sie den schnellen Knollenwachstum.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.
- Die Bandgeschwindigkeit und die Fallhöhen minimieren um mechanische Beschädigungen zu minimieren.
- Nur unter optimalen Bedingungen ernten.



Lagerung

- Mit angemessener Lagerung ist CAMELIA für die Langzeitlagerung geeignet.
- Lagertemperatur: 4 °C.
- Temperatur täglich um 0,5 - 0,7 Grad bis auf eine stabile Temperatur runterkühlen, jedoch nicht unter eine Mindesttemperatur von 4 °C.
- Regelmäßig aber kurz lüften, um eine CO2-Anhäufung zu vermeiden.
- Da CAMELIA eine lange Keimruhe hat, ist eine Langzeitlagerung bei niedrigeren Temperaturen und ohne Keimhemmung möglich.