




Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Regelmatige sortering en knolvorm
- Hoge opbrengst
- Veelzijdig ras
- Goede resistentie tegen schurft
- Geschikt voor lange bewaring



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	67	Midden vroeg
Kiemrust	102	Zeer lang
Opbrengst rijp	108	Hoog
Grofheid	84	Grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Donker geel
Vleeskleur na koken		Donkergeel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,3% / 12,5%
OWG/Soortelijk gewicht		331 / 1,07
Blauwgevoeligheid	10	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	79	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	87	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-70 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	47.500	28	23
35/50	42.000	32	26
50/55	37.000	36	30

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	57	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	71	● ● ● ● ●
Alternaria	70	● ● ● ● ●
Schurft	64	● ● ● ● ●
Poederschurft	68	● ● ● ● ●
Kringerigheid	99	● ● ● ● ●
Y-virus	98	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●
Ro5	*6	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	*5	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt




Voorbehandeling en poten

- CAMELIA heeft een zeer lange kiemrust.
- Bewaar het pootgoed niet kouder dan 5 °C. Warm voldoende op voor het poten.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Warme stoot: Minimaal 3 weken.
- Behandel CAMELIA pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- CAMELIA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdoding en oogst

- Wees alert, knollen groeien snel uit de maat.
- Minimaal 3 weken tussen loofdoding en rooien voor een goede huidvastheid.
- Beperk de snelheid van de rooimat en valhooftges om mechanische rooischade te voorkomen.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- Met het juiste bewaarregime, is CAMELIA geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Omdat CAMELIA een lange kiemrust heeft, is lange bewaring op een lage temperatuur, zonder kiemremmingmiddelen mogelijk.