




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Zeer mooie heldere schil
- Goede resistentie tegen schurft
- Hoge resistentie tegen kringerigheid
- Resistent tegen Y-virus



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	67	Midden vroeg
Kiemrust	102	Zeer lang
Opbrengst rijp	108	Hoog
Grofheid	84	Grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Donker geel
Vleeskleur na koken		Donkergeel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,3% / 12,5%
OWG/Soortelijk gewicht		331 / 1,07
Blauwgevoeligheid	10	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	79	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	87	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	47.500	28	23
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	36.000	37	31

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	57	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	71	● ● ● ● ●
Alternaria	70	● ● ● ● ●
Schurft	64	● ● ● ● ●
Poederschurft	68	● ● ● ● ●
Kringerigheid	99	● ● ● ● ●
Y-virus	98	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid		
Ro1/4 9	● ● ● ● ●	
Ro2/3 4	● ● ● ● ●	
Ro5 *6	● ● ● ● ●	
Pa2	● ● ● ● ●	
Pa3	● ● ● ● ●	

Wratziekte		
F1 10	● ● ● ● ●	
F2 *5	● ● ● ● ●	
F6 *5	● ● ● ● ●	
F18 *1	● ● ● ● ●	

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Vloeibare meststoffen met sporenelementen kunnen gecombineerd worden met de phytophthorabespuiting.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- CAMELIA heeft een lange kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
- CAMELIA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- CAMELIA heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- CAMELIA heeft een hoge resistentie tegen TRV.



Loofdoding en oogst

- Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst.
- Alleen een rijp gewas zal een goed bewaarproduct geven.
- Om het risico op rot te vermijden, oogst bij een bodemtemperatuur lager dan 25°C.
- Zorg voor een korte periode tussen loofdoding en oogst om een goede heldere schilkwaliteit te behouden.
- CAMELIA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



Bewaring

- CAMELIA heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.