



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Regelmatige sortering en knolvorm
- Geschikt voor winterteelt
- Heldere donkerrode schil
- Goed drogestofgehalte
- Goede resistentie tegen schurft en poederschurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	69	Midden vroeg
Kiemrust	65	Gemiddeld
Opbrengst groen	94	Gemiddeld
Opbrengst rijp	94	Goed
Grofheid	81	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Rood
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		19,4% / 13,5%
OWG/Soortelijk gewicht		353 / 1,075
Blauwgevoeligheid	8	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	76	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	75	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	47.500	28	23
35/45	52.000	26	21
35/55	48.000	28	23
50/55	44.500	30	25
55/65	40.000	33	28

Resistenties

Phytophthora loof	58	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	66	● ● ● ● ●
Alternaria	52	● ● ● ● ●
Schurft	71	● ● ● ● ●
Poederschurft	75	● ● ● ● ●
Kringerigheid	75	● ● ● ● ●
Y-virus	22	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	97	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	5	● ● ● ● ●
Ro5	*2	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken.
- CANBERRA is gevoelig voor gebreksziekten, daarom bemesten met sporenelementen.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.
- Een extra wekelijkse magnesiumbemesting wordt geadviseerd om gebreksverschijnselen te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH




Voorbehandeling en poten

- CANBERRA heeft een lange kiemrust.
- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
- CANBERRA is geschikt voor alle grondsoorten.




Teelt

- CANBERRA heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- CANBERRA is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- Gebruik een loofdodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol te bevorderen.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Een hoog drogestofgehalte en koude omstandigheden tijdens de oogst verhogen de kans op stootblauw.



Bewaring

- Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld.
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Voor bewaring langer dan 5 maanden is mechanische koeling vereist.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 5°C.
- Een lagere bewaartemperatuur dan aanbevolen, resulteert in hogere suikers.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO₂-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.
- CANBERRA heeft een lange kiemrust. Kiemremmers zijn alleen nodig voor late leveringen.