




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Zeer vroeg
- Geschikt voor primeurteelt
- Weinig gevoelig voor stootblauw
- Goede resistentie tegen schurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	76	Vroeg
Opbrengst groen	103	Vrij hoog
Kiemrust	66	Gemiddeld
Opbrengst rijp	101	Vrij hoog
Grofheid	87	Zeer grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		6-8
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18% / 12,2%
OWG/Soortelijk gewicht		325 / 1,069
Blauwgevoeligheid	5	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	60	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	43	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	51.000	26	22
35/45	46.000	29	24
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	38.000	35	29

Resistenties

Phytophthora loof	51	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	68	● ● ● ● ●
Alternaria	55	● ● ● ● ●
Schurft	70	● ● ● ● ●
Poederschurft	58	● ● ● ● ●
Kringerigheid	90	● ● ● ● ●
Y-virus	10	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	84	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*8	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof in 1 keer toedienen voor een vroege beginontwikkeling.
- Gedeelde gift heeft geen toegevoegde waarde. Stikstof kan in 1 keer gegeven worden.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Om vroeg te kunnen oogsten wordt organische mest afgeraden.



Teeltadvies Consumptieteelt **TRADITIONAL FRESH**



Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Zorg voor een goed afgeharde korte kiem, om kiembreuk te voorkomen.
- Lichtere grondsoorten zullen de beste resultaten geven.
- Vermijd gronden met een hoog risico op poederschurft.
- Voorkiemen is niet nodig, CARLITA kan worden geplant in het witte puntjes stadium.
- CARLITA kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.
- Knollen groeien diep in de rug. Plantdiepte: iets boven maaiveld.




Teelt

- CARLITA heeft een vroege knolzetting.
- De opkomst is een beetje traag, later ontwikkelt het loof zich goed.
- De knolzetting is laag en knollen worden snel grof.
- Zorg voor een goede vochtvoorziening om gewone schurft te voorkomen.
- Beregening kan het knolaantal aanzienlijk verhogen.
- Een regelmatige vochtvoorziening verkleint het risico op groeischeuren.
- CARLITA is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
- CARLITA is gevoelig voor Phytophthora, maar door een vroege afrijping zal dit normaal gesproken geen problemen geven.



Loofdding en oogst

- CARLITA kan geoogst worden na 75 - 90 dagen.
- CARLITA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.



Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Na lange bewaring neemt de helderheid van de schil af.
- CARLITA is licht gevoelig voor Phoma. Let op de wondheling. Een snelle temperatuurdaling verhoogt het risico op Phoma.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- CARLITA is weinig gevoelig voor Fusarium.
- Voor bewaring langer dan 3 maanden is mechanische koeling vereist.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Niet bewaren bij een temperatuur lager dan 4 °C.