CARLITA

JAERLA X PROVITA

Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH

- **Tubérculos grandes**
- **Muito precoce**
- **Apropriada como batata primor**
- **Boa tolerância a golpes**
- **Boa resistência à sarna comum**



Propriedades agronómicas

Maturação	76	Precoce
Periodo de dormencia	66	Medio
Rendimento precoce	103	Moderado alto
Produto final maturação	101	Moderado alto
Tamanho tubérculos	87	Muito grandes
Forma dos tubérculos		Redondo-oval / Oval
Numero de tubérculos		6-8
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		AB - Moderadamente firm
Peso de matéria seca/Aln		18% / 12,2%
Teor de matéria seca/Pes		325 / 1,069
Enegrecimento interno	5	Não sensível
Sens. ao Metribuzin	60	
Formacao de Batatinhas	43	

Cor da pele e carne

Tipo culinário

Maturação

Densidade de Plantação

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas 75 cm	90 cm
28/35	51.000	26	22
35/45	46.000	29	24
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	38.000	35	29

Resistências

Mildio da folha	51	
Mildio do tuberculo	68	
Alternaria	55	
Sarna comum	70	
Sarna pulvurolenta	58	
Spraing	90	
PVY	10	
Yntn tolerancia tubérculos	84	

Res. aos nematodos		Res. verruga	
Ro1/4	9	F1	10
Ro2/3	*8	F2	
Ro5	*1	F6	
Pa2		F18	
Pa3			

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertelização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
-
- O azoto pode ser aplicado numa dose única, o que ajudará a promover o desenvolvimento da cultura.
- As aplicações fracionadas de azoto não acrescentam qualquer valor à cultura. Pode fazer-se uma única aplicação de azoto.
- Azoto (N): Aplicação média (170-210Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.
- Para um arranque precoce, não se aconselha a utilização de matéria orgânica.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025
www.hzpc.com

CARLITA

JAERLA X PROVITA

Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH

Preparação e Plantação

- Um tratamento térmico é o ideal para quebrar a dormência.
- Permitir que a semente se adapte às condições locais antes da plantação.
- "Não desgrelar para evitar a ""formação de batatinhas""."
- Garantir brolhos suficientemente fortes para evitar que se quebrem.
- Os melhores resultados são obtidos em solos leves.
- Evitar solos com risco elevado de sarna pulverulenta.
- O pré-abrolhamento não é necessário, CARLITA pode ser plantada com pequenos brolhos brancos.
- CARLITA pode ser plantada mais cedo, mas evitando condições frias.
- Plantar ligeiramente acima do nível do solo, os tubérculos crescem em profundidade.



Cultivo

- A tuberização é precoce.
- A emergência é um pouco lenta, posteriormente a planta desenvolve-se bem.
- O número de tubérculos é muito reduzido, pelo que os tubérculos podem ficar muito grandes.
- Garantir uma boa humidade do solo para prevenir o aparecimento de sarna comum.
- Irrigação pode aumentar substancialmente o número de tubérculos.
- "Uma irrigação regular minimiza o aparecimento de ""rachaduras""."
- CARLITA é suscetível à Alternaria. Começar tratamento no período da floração.
- Utilizar produtos que tenham efeito no controlo da Alternaria solani e da Alternaria alternata.
- Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.
- CARLITA é suscetível ao Míldio, mas devido à sua maturidade precoce, o Míldio não constitui normalmente um problema.



Defenagem e Colheita

- O arranque do CARLITA pode ser feito após 75-90 dias.
- CARLITA é moderadamente suscetível a golpes. Reduzir a altura de queda e evitar danos mecânicos.
- Os tubérculos são de calibre grande. O arranque e a armazenagem devem ser efetuados com cuidado para evitar danos e golpes.



Armazenamento

- CARLITA é adequada para armazenamento, inclusivamente por períodos mais longo.
- Quando é armazenada por um período longo, a pele fica menos brilhante.
- CARLITA é ligeiramente suscetível a Phoma, pelo que é necessário ter em atenção uma boa cicatrização da pele. Uma descida brusca de temperatura aumentará o risco de Phoma.
- Ter em atenção o período de cicatrização.
- CARLITA é um pouco suscetível ao Fusarium.
- Para um armazenamento superior a 3 meses, é necessária refrigeração.
- Reduzir a temperatura 0,5 ºC-0,7 ºC por dia, nunca inferior a 4 ºC.
- Não armazenar a uma temperatura inferior a 4 ºC.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025
www.hzpc.com