



Producción de consumo France

- Muy apropiada para cosecha temprana
- Tubérculos grandes
- Piel brillante muy atractiva
- Tubérculo de calibre y forma uniformes
- Maduración temprana



Propiedades agronómicas

Maduración	77	Temprana
Período de dormencia	56	Medio
Producción	99	Bastante alta
Tamaño del tuberculo	86	Muy grandes
Forma		Oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		17% / 11,2%
/Peso específico		304 / 1,064
Golpeo interno	10	Algo sensible
Sens. Metribuzin	65	●●●●●
Fenómeno patatitas	41	●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-65 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	48.000	25	21
35/45	42.000	32	26
45/50	38.000	35	29
50/55	32.000	42	35

Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildió en planta	50	●●●●●
Mildió en el tubérculo	68	●●●●●
Alternaria	65	●●●●●
Sarna común	60	●●●●●
Sarna verrugosa	59	●●●●●
Spraing	70	●●●●●
Virus Y	13	●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	98	●●●●●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 9	●●●●●	F1 *1	●●●●●
Ro2/3 *8	●●●●●	F2 *1	●●●●●
Ro5 *3	●●●●●	F6	●●●●●
Pa2	●●●●●	F18 *1	●●●●●
Pa3	●●●●●		


* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aporte alto (210-250Kg N/ha incluido las reservas del suelo).
- CARRERA es susceptible a carencias de minerales, por lo tanto fertilizar con microelementos.
- El manganeso y el magnesio proporcionan una planta fuerte y previenen la senescencia prematura.
- Se aconseja una aplicación adicional de boro en terrenos ligeros.
- Debe asegurarse una disponibilidad constante de agua y nutrientes, puesto que una paralización seguida de un crecimiento rápido, podría dar lugar a agrietamientos.



Producción de consumo France



Cultivo

- CARRERA tiene una dormencia media.
- La prebrotación ayuda a acelerar el crecimiento.
- "Sensible al fenómeno de ""patatitas""."
- Tratar siempre la semilla de CARRERA contra rizoctonia.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento.
- No plantar en suelos fríos, ya que hay riesgo de emergencia irregular.




Período de cultivo

- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- Las condiciones climáticas tienen una fuerte influencia en la efectividad del metribuzin, hay que adaptar la dosis según las circunstancias.
- Los riegos regulares minimizan el riesgo de agrietaduras.
- Limitar el riego en la segunda parte del cultivo para asegurar la correcta fijación de la piel.
- Utilizar tratamientos estrictos contra Phytophthora, ya que es muy susceptible en planta y tubérculo.
- CARRERA es sensible a Alternaria. Comenzar los tratamientos en el momento de la floración.
- Usar productos que tengan efecto en Alternaria solani y Alternaria alternata.
- Utilizar más tarde en el cultivo productos con una fuerte protección en el tubérculo contra el mildiu en el tubérculo.



Destrucción de las plantas

- CARRERA tiene una maduración bastante temprana, la destrucción de la planta no debería causar ningún problema.
- CARRERA tiene una buena separación del estolón.
- Mínimo tres semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- Evitar especialmente los daños mecánicos para prevenir infecciones posteriores por Fusarium.
- Los tubérculos son de gran calibre. Cosechar y almacenar con cuidado para evitar daños y golpes.



Almacenamiento

- Una cosecha recolectada en buenas condiciones se puede enfriar rápidamente después de la primera cura.
- Evitar la deshidratación, enfriar con una pequeña diferencia entre el aire de refrigeración y la temperatura del producto.
- ALMACENAMIENTO EN CÁMARA FRIGORÍFICA
- Reducir la temperatura entre 0,5-0,7 °C por día hasta llegar a un valor estable que no sea inferior a 5 °C.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones tempranas y un elevado riesgo a sarna plateada.