CARRERA

ALLARD X CONCURRENT

HZPC
keeps you growing

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France

- **Très adaptée aux marchés primeurs**
- **Tubercules de gros calibres**
- **Peau très brillante et attractive**
- **Tubercules réguliers en forme et calibre**
- **Maturité précoce**



Caractéristiques agronomiques

Maturité	77	Hâtive
Période de dormance	56	Moyenne
Rendement à maturité	99	Moyen à élevé
Calibre	86	Très gros
Forme		Oblong
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune
Type de cuisson		AB - Assez ferme
Matière sèche/Amidon %		17% / 11,2%
Poids sous l'eau/		304 / 1,064
Noircissement interne	10	Peu sensible
Sens. à la Métribuzine	65	
Boulage	41	

Couleur de peau et chair

Type de cuisson

Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 40-65 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs 75 cm	Inter-rangs 90 cm
28/35	48.000	25	21
35/45	42 000	32	26
45/50	38 000	35	29
50/55	32 000	42	35

Profondeur de plantation: 3 cm plus profond que la normale.
Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	50	
Mildiou du tubercule	68	
Alternaria	65	
Gale commune	60	
Gale poudreuse	59	
Virus rattle du tabac	70	
Virus Y	13	
Yntn virus sur tubercule	98	

Nématodes		Galle Verruqueuse	
Ro1/4	9	F1	*1
Ro2/3	*8	F2	*1
Ro5	*3	F6	
Pa2		F18	*1
Pa3			

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre Région.
- Azote (N): Besoins élevés (210-250 kg N/ha, reliquats inclus).
- CARRERA est sensible aux carences en minéraux, il faut donc utiliser des engrais à base d'oligoéléments.
- Des apports de manganèse et de magnésium encourageront le développement d'un feuillage robuste et préviendront une sénescence prématurée.
- Sur des sols plus légers, un apport supplémentaire de bore est recommandé.
- Garantir un apport constant en eau et en nutriments. Une stagnation dans la croissance, suivie d'un développement rapide, pourrait induire l'apparition de tubercules fendus.

L'usage de ces informations est sous la responsabilité de l'utilisateur qui doit les adapter à sa situation. HZPC décline toute responsabilité.

24 Janv. 202

www.hzpc.com
Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau
au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com

CARRERA

ALLARD X CONCURRENT

HZPC
keeps you growing

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France



Plantation

- CARRERA présente une dormance moyenne.
- La prégermination favorise la croissance de la plante.
- Sensible au boulage.
- Toujours traiter les plants de CARRERA contre le rhizoctone.
- Construire une butte importante pour éviter le verdissement des tubercules.
- Ne pas planter dans des sols froids. Cela peut augmenter le risque d'une levée irrégulière.



Culture

- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Pour une bonne efficacité, adapter la dose de métribuzine en fonction des conditions météo.
- Une irrigation régulière réduira considérablement le risque de tubercules fendus.
- Limiter l'apport d'eau dans la deuxième partie du cycle pour permettre la formation de la peau.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou sur feuillage et tubercules.
- CARRERA est sensible à l'Alternaria. Commencer les traitements anti-alternaria au cours de la floraison.
- Utiliser des produits qui ont un effet sur Alternaria solani et Alternaria alternata.
- Utiliser en fin de cycle un programme fongicide efficace contre le mildiou sur tubercules.



Défanage et Récolte

- CARRERA étant une variété hâtive, le défanage est facile.
- Les stolons de CARRERA se détachent facilement.
- Respecter un délai défanage - récolte de 3 semaines minimum.
- Veiller à éviter tous endommagements mécaniques pour prévenir une attaque ultérieure de Fusarium.
- Les tubercules sont de gros calibres. Récolter et stocker avec soin pour éviter les coups bleus et les endommagements.



Conservation

- Récoltés dans de bonnes conditions les tubercules peuvent être refroidis rapidement après la première cicatrisation.
- Afin d'éviter une déshydratation importante, refroidir avec une faible amplitude thermique entre l'air de refroidissement et les tubercules.
- STOCKAGE AU FRIGO
- Stabiliser la température au dessus de 5 °C en la réduisant de 0,5 à 0,7 °C par jour.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.
- Toute fluctuation de température, combinée à de la condensation, peut se traduire par une germination précoce et un risque plus élevé de gale argentée.

L'usage de ces informations est sous la responsabilité de l'utilisateur qui doit les adapter à sa situation. HZPC décline toute responsabilité.

www.hzpc.com
Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau
au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com