CARRERA

ALLARD X CONCURRENT

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES

- **Très adaptée aux marchés primeurs**
- **Tubercules de gros calibres**
- **Peau très brillante et attractive**
- **Tubercules réguliers en forme et calibre**
- **Maturité précoce**



Caractéristiques agronomiques

Maturité	77	Hâtive
Période de dormance	56	Moyenne
Rendement à maturité	99	Moyen à élevé
Calibre	86	Très gros
Forme		Oblong
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune
Type de cuisson		AB - Assez ferme
Matière sèche/Amidon %		17% / 11,2%
Poids sous l'eau/		304 / 1,064
Noircissement interne	10	Peu sensible
Sens. à la Métribuzine	65	
Boulage	41	

Couleur de peau et chair

Type de cuisson

Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 40-65 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs 75 cm	Inter-rangs 90 cm
28/35	67 000	20	17
35/45	56 000	24	20
35/55	50 000	27	22
50/55	43.000	31	26
55/65	40.000	33	28

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.
Couper les tubercules de gros calibre n'est pas

Résistances

Mildiou du feuillage	50
Mildiou du tubercule	68
Alternaria	65
Gale commune	60
Gale poudreuse	59
Virus rattle du tabac	70
Virus Y	13
Yntn virus sur tubercule	98

Nématodes

Ro1/4	9
Ro2/3	*8
Ro5	*3
Pa2	
Pa3	

Galle Verruqueuse

F1	*1
F2	*1
F6	
F18	*1

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

L'usage de ces informations est sous la responsabilité de l'utilisateur qui doit les adapter à sa situation. HZPC décline toute responsabilité.

CARRERA

ALLARD X CONCURRENT

HZPC
keeps you growing

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES

Plantation

- CARRERA présente une dormance moyenne.
- Si un germe apical est présent, il faut le retirer et planter des plants au stade point blanc.
- Bien réchauffer les plants. Planter au stade point blanc.
- Le traitement des plants est conseillé pour contrôler le rhizoctone, la gale argentée et d'autres maladies telluriques affectant la peau.
- La meilleure qualité sera obtenue sur des sols fertiles et légèrement argileux.
- Si la parcelle présente des terres lourdes, il est important d'avoir une bonne structure.
- Nous recommandons de planter CARRERA 3 cm plus profond que la normale pour éviter le verdissement.



Culture

- Appliquer une dose initiale d'azote importante si le développement du feuillage est faible.
- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Pour une bonne efficacité, adapter la dose de métribuzine en fonction des conditions météo.
- Une irrigation régulière réduira considérablement le risque de tubercules fendus.
- Limiter l'apport d'eau dans la deuxième partie du cycle pour permettre la formation de la peau.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou sur feuillage et tubercules.
- CARRERA est sensible à l'Alternaria. Commencer les traitements anti-alternaria au cours de la floraison.
- Utiliser des produits qui ont un effet sur Alternaria solani et Alternaria alternata.
- Utiliser en fin de cycle un programme fongicide efficace contre le mildiou sur tubercules.



Défanage et Récolte

- CARRERA étant une variété hâtive, le défanage est facile.
- Les stolons de CARRERA se détachent facilement.
- Veiller à éviter tous endommagements mécaniques pour prévenir une attaque ultérieure de Fusarium.
- Les tubercules sont de gros calibres. Récolter et stocker avec soin pour éviter les coups bleus et les endommagements.



Conservation

- CARRERA est une variété hâtive. Par conséquent, les ventes se font normalement dans les 5 mois suivant la récolte.
- Récoltés dans de bonnes conditions les tubercules peuvent être refroidis rapidement après la première cicatrisation.
- Afin d'éviter une déshydratation importante, refroidir avec une faible amplitude thermique entre l'air de refroidissement et les tubercules.
- Pour une période de conservation supérieure à 3 mois, un stockage réfrigéré est requis.
- STOCKAGE AU FRIGO
- Stabiliser la température au dessus de 5 °C en la réduisant de 0,5 à 0,7 °C par jour.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.
- Toute fluctuation de température, combinée à de la condensation, peut se traduire par une germination précoce et un risque plus élevé de gale argentée.

L'usage de ces informations est sous la responsabilité de l'utilisateur qui doit les adapter à sa situation. HZPC décline toute responsabilité.

Densité du peuplement

conseillé.

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Appliquer 4/5 avant la plantation et 1/5 en couverture.
- Azote (N): Besoins élevés (210-250 kg N/ha, reliquats inclus).
- CARRERA est sensible aux carences en minéraux, il faut donc utiliser des engrais à base d'oligoéléments.
- Des apports de manganèse et de magnésium encourageront le développement d'un feuillage robuste et préviendront une sénescence prématurée.
- Sur des sols plus légers, un apport supplémentaire de bore est recommandé.
- Garantir un apport constant en eau et en nutriments. Une stagnation dans la croissance, suivie d'un développement rapide, pourrait induire l'apparition de tubercules fendus.