CARRERA

ALLARD X CONCURRENT

France

- **Idonea per una raccolta precoce**
- **Tuberi di grande calibro**
- **Buccia lucente, molto invitante**
- **Uniformità di calibro e di forma dei tuberi**
- **Ciclo precoce**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	77	Precoce
Durata della dormienza	56	Moderata
Resa	99	Mediamente alta
Calibro del tubero	86	Molto grosso
Forma del tubero		Ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo
Tipo di cottura		AB - Quasi Soda
Sostanza secca/Amido		17% / 11,2%
Contenuto de sostanza se		304 / 1,064
Inbrunimento interno	10	Qualcosa sensibile
Sens. al Metribuzin	65	
Tuberomania	41	

Colore della pelle e pasta

Tipo di cottura

Maturazione

Densità di semina

Mercato: 40-65 mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila 75 cm	90 cm
28/35	48.000	25	21
35/45	42.000	32	26
45/50	38.000	35	29
50/55	32.000	42	35

Profondità di semina: 3 cm più in profondità del normale.
Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	50	
Peronospora del tubero	68	
Alternaria	65	
Scabbia comune	60	
Scabbia polverulenta	59	
Macchie intern.nematodi	70	
PVY	13	
Yntn tolleranza tubero	98	

Res. a nematodi

Ro1/4	9	
Ro2/3	*8	
Ro5	*3	
Pa2		
Pa3		

Res. a Rogna Nera

F1	*1	
F2	*1	
F6		
F18	*1	

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
-
- Azoto (N): Bisogni alti (210-250 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- CARRERA è suscettibile a carenze di minerali, quindi concimare con microelementi.
- Manganese e magnesio stimolano lo sviluppo di un fogliame robusto e ritardano la senescenza.
- Nei terreni leggeri una concimazione con boro è consigliata.
- Garantire una costante disponibilità di acqua e nutrienti. Condizioni di asfissia nel terreno seguite da una rapida crescita potrebbero portare a spaccature.

L'uso di queste informazioni è sotto la responsabilità dell'utente che deve adattarle alla sua situazione. HZPC non si assume alcuna responsabilità. 24 Gen 2025
www.hzpc.com
Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau
au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com

CARRERA

ALLARD X CONCURRENT

France



Preparazione dei tuberi e semina

- CARRERA ha media dormienza.
- La pre-germinazione contribuisce ad anticipare la crescita.
- Sensibile alla tuberomania.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.
- Effettuare una buona rincalzatura per evitare la presenza di tuberi verdi.
- Non piantare in terreno freddo per evitare emergenza irregolare.



Coltivazione

- L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un dosaggio inferiore.
- Le condizioni climatiche hanno una notevole influenza sull'efficacia del metribuzin, usare una dose adatta alle circostanze.
- L'irrigazione regolare minimizza il rischio di spaccature.
- Al fine di ottenere un'ottima buccia, limitare l'irrigazione nella seconda parte della stagione.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni sia al fogliame che sui tuberi.
- CARRERA è suscettibile all'Alternaria. Iniziare i trattamenti dal momento della fioritura.
- Usare principi attivi che siano efficaci contro Alternaria solani e Alternaria alternata.
- Nella fase finale del ciclo vegetativo, usare prodotti in grado di proteggere i tuberi.

Maturazione e raccolta

- CARRERA è alquanto precoce, la bruciatura degli steli non dà alcun problema.
- CARRERA si distacca facilmente dagli stoloni.
- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno tre settimane prima della raccolta.
- Fare molta attenzione a non arrecare danni meccanici per prevenire successive infezioni da Fusarium.
- I tuberi sono grossi. Raccogliere e conservare con delicatezza per evitare danni e urti.



Conservazione

- Il prodotto raccolto in buone condizioni può essere raffreddato rapidamente dopo la prima fase di maturazione.
- Prevenire la disidratazione, facendo in modo che la differenza tra l'aria di raffreddamento e la temperatura del prodotto non sia elevata.
- CONSERVARE IN FRIGO.
- Ridurre la temperatura di 0,5 - 0,7 gradi al giorno fino ad un valore non inferiore a 5° C.
- Ventilare regolarmente, ma per tempi brevi, per evitare l'accumulo di CO_2.
- Qualsiasi variazione di temperatura, combinata con la presenza di condensa, può portare ad una germinazione precoce e a un elevato rischio di scabbia argentea.

L'uso di queste informazioni è sotto la responsabilità dell'utente che deve adattarle alla sua situazione. HZPC non si assume alcuna responsabilità. 24 Gen 2025
www.hzpc.com
Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau
au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com