



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Zeer geschikt voor vroege oogst
- Grove knollen
- Zeer mooie heldere schil
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Vroege afrijping



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	77	Vroeg
Kiemrust	56	Gemiddeld
Opbrengst rijp	99	Vrij hoog
Grofheid	86	Zeer grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		17% / 11,2%
OWG/Soortelijk gewicht		304 / 1,064
Blauwgevoeligheid	10	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	65	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	41	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-65 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	48.000	25	21
35/45	42.000	32	26
45/50	38.000	35	29
50/55	32.000	42	35

Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	50	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	68	● ● ● ● ●
Alternaria	65	● ● ● ● ●
Schurft	60	● ● ● ● ●
Poederschurft	59	● ● ● ● ●
Kringerigheid	70	● ● ● ● ●
Y-virus	13	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	98	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid		Wratziekte	
Ro1/4	9	● ● ● ● ●	F1 *1 ● ● ● ● ●
Ro2/3	*8	● ● ● ● ●	F2 *1 ● ● ● ● ●
Ro5	*3	● ● ● ● ●	F6 ● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●	F18 *1 ● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●	


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- CARRERA is gevoelig voor gebreksziekten, daarom bemesten met sporenelementen.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.
- Op lichtere gronden wordt een extra boriumgift geadviseerd.
- Zorg voor een constante beschikbaarheid van water en voedingsstoffen. Groeistagnatie gevolgd door snelle groei kan groeischeuren geven.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- CARRERA heeft een gemiddelde kiemrust.
- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- Gevoelig voor onderzeeërvorming.
- Behandel CARRERA pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.
- Niet planten in koude grond, dit geeft een verhoogd risico op een onregelmatige opkomst.




Teelt

- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- Een regelmatige vochtvoorziening verkleint het risico op groeischeuren.
- Beperk de beregening in het 2e deel van het seizoen i.v.m. een dunne schil.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- CARRERA is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming.



Loofdding en oogst

- CARRERA heeft een vroege afrijping. Loofvernietiging zal geen problemen geven.
- Knollen laten makkelijk los van het loof.
- Minimaal 3 weken tussen loofdding en rooien voor een goede huidvastheid.
- Beperk zoveel mogelijk mechanische beschadiging om Fusarium te voorkomen.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.



Bewaring

- Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld.
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- MECHANISCHE KOELING
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 5°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverscurft.