CARRERA

ALLARD X CONCURRENT

Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH

- **Muito apropriada para uma colheita precoce**
- **Tubérculos grandes**
- **Pele bastante atrativa e brilhante**
- **Calibre e forma dos tubérculos uniformes**
- **Maturação precoce**



Propriedades agronómicas

Maturação	77	Precoce
Periodo de dormencia	56	Medio
Produto final maturação	99	Moderado alto
Tamanho tubérculos	86	Muito grandes
Forma dos tubérculos		Oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		AB - Moderadamente firm
Peso de matéria seca/Aln		17% / 11,2%
Teor de matéria seca/Pes		304 / 1,064
Enegrecimento interno	10	Pouco sensível
Sens. ao Metribuzin	65	
Formacao de Batatinhas	41	

Cor da pele e carne

Tipo culinário

Maturação

Densidade de Plantação

Mercado: 40-65 mm.

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas 75 cm	90 cm
28/35	67.000	20	17
35/45	56.000	24	20
35/55	50.000	27	22
50/55	43.000	31	26
55/65	40.000	33	28

Verificar sempre a contagem de tubérculos para um cálculo correto.
O corte de tubérculos grandes não é aconselhado.

Resistências

Mildio da folha	50	
Mildio do tuberculo	68	
Alternaria	65	
Sarna comum	60	
Sarna pulvurolenta	59	
Spraing	70	
PVY	13	
Yntn tolerancia tubérculos	98	

Res. aos nematodos

Ro1/4	9	
Ro2/3	*8	
Ro5	*3	
Pa2		
Pa3		

Res. verruga

F1	*1	
F2	*1	
F6		
F18	*1	

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertelização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
- Aplicar 4/5 antes da plantação e 1/5 na cobertura.
- Azoto (N): Aplicação elevada (210-250Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- CARRERA é suscetível à deficiência de minerais, por essa razão planear antecipadamente a fertilização.
- O Manganês e o Magnésio fortalecem a folhagem e previnem a morte prematura.
- Em solos arenosos leves, aconselha-se uma aplicação extra de Boro.
- "Assegurar o fornecimento constante de água e nutrientes. A paragem no crescimento dos tubérculos, pode provocar ""rachaduras""."

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025
www.hzpc.com

CARRERA

ALLARD X CONCURRENT

Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH



Preparação e Plantação

- CARRERA tem uma dormência média.
- Se tiver um brolho apical, retirar e plantar com pequeno brolhos brancos.
- Aquecer corretamente a semente e plantar com pequenos grelos brancos.
- Aconselha-se o tratamento da semente para o controlo da Rhizoctonia, sarna prateada e outros problemas de pele que possam aparecer.
- A melhor qualidade obtém-se em solos argilosos e férteis.
- Quando plantada em terrenos mais fortes, é importante ter uma boa estrutura.
- Plantar CARRERA a mais 3 cm de profundidade para evitar batatas verdes.

Cultivo

- Fraco desenvolvimento da folhagem, aplicar uma dose inicial elevada de Azoto.
- Recomenda-se a utilização de Metribuzina em pré-emergência. Em caso de pós-emergência, utilizar doses mais baixas.
- "As condições climatéricas têm uma forte influência no efeito da Metribuzina
- "Uma irrigação regular minimiza o aparecimento de ""rachaduras""."
- Devido à pele fina, limitar a irrigação na segunda metade.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha e do tubérculo.
- CARRERA é suscetível à Alternaria. Começar tratamento no período da floração.
- Utilizar produtos que tenham efeito no controlo da Alternaria solani e da Alternaria alternata.
- Utilizar, mais tarde durante o cultivo, produtos com uma forte proteção contra o Míldio do tubérculo.



Defenagem e Colheita

- CARRERA tem uma maturação bastante precoce, pelo que a dessecagem não deverá causar problemas.
- CARRERA tem uma boa separação.
- Prestar uma atenção especial para evitar danos mecânicos para prevenir uma infeção posterior por Fusarium.
- Os tubérculos são de calibre grande. O arranque e a armazenagem devem ser efetuados com cuidado para evitar danos e golpes.



Armazenamento

- CARRERA é uma variedade precoce, pelo que a sua comercialização ocorre normalmente nos 5 meses subsequentes à sua colheita.
- Quando a colheita foi feita em boas condições, as batatas podem ser arrefecidas rapidamente após o primeiro tratamento.
- Prevenir a desidratação, arrefecer com una pequena diferença entre o ar de refrigeração e a temperatura do produto.
- Para um armazenamento superior a 3 meses, é necessária refrigeração.
- ARMAZENAMENTO EM CÂMARA FRIGORIFICA
- Reduzir a temperatura 0,5 ºC-0,7 ºC por dia, até um valor estável, nunca inferior a 5 ºC.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
- Qualquer alteração da temperatura, em combinação com condensação, pode resultar num abrolhamento precoce e num elevado risco de aparecimento de Sarna prateada.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025
www.hzpc.com