




Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES

- Bon potentiel de rendement
- Bonne résistance à la chaleur et au stress hydrique
- Plusieurs segments de marché possibles
- Teneur en matière sèche élevée
- Bonne résistance au mildiou



Caractéristiques agronomiques

Maturité	62	Demi-tardive
Période de dormance	78	Longue
Rendement à maturité	111	Élevé
Calibre	82	Gros
Forme		Oblong court
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune clair
Type de cuisson		AB - Assez ferme
Matière sèche/Amidon %		21,6% / 15,7%
Poids sous l'eau/		399 / 1,086
Noircissement interne	13	Moyennement sensible
Sens. à la Métribuzine	70	● ● ● ● ●
Boulage	71	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 45-75 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	46 000	29	24
35/45	43.000	31	26
35/55	42 000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	37.000	36	30

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	92	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	86	● ● ● ● ●
Alternaria	73	● ● ● ● ●
Gale commune	61	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	67	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	92	● ● ● ● ●
Virus Y	20	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	8	● ● ● ● ●
Ro5	*9	● ● ● ● ●
Pa2	8	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	9	● ● ● ● ●
F18	9	● ● ● ● ●

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre Région.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Nous recommandons le fractionnement de l'azote pour conserver un feuillage vigoureux et obtenir ainsi de plus gros tubercules.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation **TRADITIONAL FRES**




Plantation

- CAYMAN présente une longue dormance.
- Bien réchauffer les plants. Planter au stade point blanc.
- Toujours traiter les plants de CAYMAN contre le rhizoctone.
- CAYMAN peut être cultivée sur tous types de sols, même dans des conditions où l'eau disponible est limitée.




Culture

- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- CAYMAN a une bonne tolérance au stress hydrique.



Défanage et Récolte

- Respecter un délai défanage - récolte de 3 semaines minimum.
- CAYMAN est modérément sensible aux coups bleus. Diminuer la hauteur de chute et éviter les endommagements mécaniques.
- Récolter uniquement quand les conditions optimales sont réunies.



Conservation

- CAYMAN a une bonne dormance. Par conséquent, un stockage à température ambiante peut être utilisé pendant les premiers mois suivant la récolte.
- Avec une gestion correcte du stockage, CAYMAN présente une bonne aptitude à la longue conservation.
- Température de stockage : 6 °C.
- Stabiliser la température à 6 °C en la réduisant de 0,5 à 0,7 °C par jour.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO₂.
- Pour une longue conservation, l'emploi d'inhibiteurs de germination est conseillé.