




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Goede opbrengst
- Goede droogte- en hittetolerantie
- Geschikt voor diverse marktsegmenten
- Hoog drogestofgehalte
- Resistent tegen Phytophthora



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	62	Midden laat
Kiemrust	78	Lang
Opbrengst rijp	111	Hoog
Grofheid	82	Grof
Knolvorm		Rondovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		21,6% / 15,7%
OWG/Soortelijk gewicht		399 / 1,086
Blauwgevoeligheid	13	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	70	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	71	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 45-75 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	46.000	29	24
35/45	43.000	31	26
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	37.000	36	30

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	92	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	86	● ● ● ● ●
Alternaria	73	● ● ● ● ●
Schurft	61	● ● ● ● ●
Poederschurft	67	● ● ● ● ●
Kringerigheid	92	● ● ● ● ●
Y-virus	20	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	8	● ● ● ● ●
Ro5	*9	● ● ● ● ●
Pa2	8	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	9	● ● ● ● ●
F18	9	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Een gedeelte gift wordt geadviseerd voor een vitaal gewas, dit zal resulteren in grovere knollen.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt **TRADITIONAL FRESH**



Voorbehandeling en poten

- CAYMAN heeft een lange kiemrust.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel CAYMAN pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- CAYMAN kan worden geteeld op alle grondsoorten, ook onder omstandigheden waar weinig water beschikbaar is.




Teelt

- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- CAYMAN heeft een goede droogtetolerantie.



Loofdding en oogst

- Minimaal 3 weken tussen loofding en rooien voor een goede huidvastheid.
- CAYMAN is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- CAYMAN heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.
- Met het juiste bewaarregime, is CAYMAN geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 6 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, van 6°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.