

CLEOPATRA

ZPC 50 35 X DESIREE



HZPC
keeps you growing

Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH

- Frühe Abreife und frühe Knollenbildung
- Großfallend
- Hoher Ertrag
- Hoher Trockenstoffgehalt
- Geeignet für Bratkartoffeln und "Haus-Pommes"



Sorteneigenschaften

Reifezeit	80	Früh
Keimruhe	60	Mittel
Ertrag bei früher Ernte	94	Durchschnittlich
Ertrag	95	Gut
Sortierung	83	Großfallend
Knollenform		Oval / Langoval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Rot
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		B - Vorwiegend Mehlig
TS/Stärke %		20,2% / 14,3%
UWG/Spec. Gewicht		369 / 1,079
Blaufleckigkeit	15	Ziemlich empfindlich
Metribuzin Empf.	65	●●●●●
Knöllchensucht	85	●●●●●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	46 000	29	24
35/45	43.000	31	26
35/55	42 000	32	26
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Resistenz

Krautfäule	26	●●●●●
Knollenfäule	56	●●●●●
Alternaria	68	●●●●●
Schorf	42	●●●●●
Pulverschorf	55	●●●●●
Eisenfleckigkeit	84	●●●●●
Y-Virus	14	●●●●●
Yntn Knollentoleranz	99	●●●●●

Nematodenresist.

Ro1/4 *2	●●●●●	F1	8	●●●●●
Ro2/3 *2	●●●●●	F2	9	●●●●●
Ro5 *2	●●●●●	F6	9	●●●●●
Pa2 *2	●●●●●	F18		●●●●●
Pa3 *2	●●●●●			

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Stickstoff (N): Sehr hoher Bedarf (>250 kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.

CLEOPATRA

ZPC 50 35 X DESIREE



HZPC
keeps you growing

Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH



Vorbereitung und Pflanzung

- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen an den örtlichen Gegebenheiten akklimatisieren.
- Physiologisch gealtertes Pflanzgut und Vorkeimen geben eine frühere Ernte.
- Pulverschorfanfällige Böden vermeiden.




Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- hat einen frühen Knollenansatz.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.
- Eine vorbeugende Behandlung gegen Phytophthora wird empfohlen.



Krautregulierung und Ernte

- CLEOPATRA reift früh ab, Krautregulierung verläuft problemlos.
- Die Knollen sind großfallend. Vorsicht bei der Ernte und Lagerung, um Beschädigungen und Blaufleckigkeit zu vermeiden.



Lagerung

- Schnell trocknen und trocken halten, um Silberschorf zu vermeiden.
- CLEOPATRA hat eine mäßige Resistenz gegen Phoma und Fusarium.
- Eine stabile Temperatur während der Lagerung beugt der Entwicklung von Silberschorf vor.
- Kondenswasser während der Lagerung vermeiden.