

CLEOPATRA

ZPC 50 35 X DESIREE



HZPC
keeps you growing

Producción de consumo TRADITIONAL FRESH

- **Maduración y tuberización temprana**
- **Tubérculos grandes**
- **Buena producción**
- **Buen contenido de materia seca**
- **Apropiada para hacer patatas fritas caseras**



Propiedades agronómicas

Maduración	80	Temprana
Período de dormencia	60	Medio
Producción	94	Media
Producción	95	Bien
Tamaño del tuberculo	83	Calibre grande
Forma		Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Roja
Color carne cocinar		Amarilla clara
Tipo de cocion		B - Ligeramente harinos
Materia seca/Almidon %		20,2% / 14,3%
/Peso específico		369 / 1,079
Golpeo interno	15	Bastante sensible
Sens. Metribuzin	65	●●●●●
Fenómeno patatitas	85	●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	46.000	29	24
35/45	43.000	31	26
35/55	42.000	32	26
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Resistencias

Mildíu en planta	26	●●●●●
Mildíu en el tubérculo	56	●●●●●
Alternaria	68	●●●●●
Sarna común	42	●●●●●
Sarna verrugosa	55	●●●●●
Spraing	84	●●●●●
Virus Y	14	●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	99	●●●●●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 *2	●●●●●	F1	8 ●●●●●
Ro2/3 *2	●●●●●	F2	9 ●●●●●
Ro5 *2	●●●●●	F6	9 ●●●●●
Pa2 *2	●●●●●	F18	●●●●●
Pa3 *2	●●●●●		

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
-
- Nitrógeno (N): aporte muy alto (>250Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.



Producción de consumo TRADITIONAL FRESH



Cultivo

- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales.
- Semilla fisiológicamente envejecida / la prebrotación proporciona una cosecha más temprana.
- Evitar terrenos con alto riesgo a sarna pulverulenta o sarna común.




Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- La tuberización es temprana.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.



Destrucción de las plantas

- CLEOPATRA tiene una maduración bastante temprana, la destrucción de la planta no debería causar ningún problema.
- Los tubérculos son de gran tamaño. Cosechar y almacenar con cuidado para evitar daños y golpes.



Almacenamiento

- Secar rápidamente y mantener el producto seco para evitar la sarna plateada.
- CLEOPATRA tiene una resistencia moderada a Phoma y Fusarium.
- Unas temperaturas estables durante el almacenamiento evitan el desarrollo de sarna plateada.
- Evitar la condensación durante el almacenamiento.