



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Vroege rijptijd met vroege knolzetting
- Grove knollen
- Goede opbrengst
- Goed drogestofgehalte
- Geschikt voor (thuis)frites



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	80	Vroeg
Opbrengst groen	94	Gemiddeld
Kiemrust	60	Gemiddeld
Opbrengst rijp	95	Goed
Grofheid	83	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Rood
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		20,2% / 14,3%
OWG/Soortelijk gewicht		369 / 1,079
Blauwgevoeligheid	15	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	65	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	85	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	46.000	29	24
35/45	43.000	31	26
35/55	42.000	32	26
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Resistenties

Phytophthora loof	26	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	56	● ● ● ● ●
Alternaria	68	● ● ● ● ●
Schurft	42	● ● ● ● ●
Poederschurft	55	● ● ● ● ●
Kringerigheid	84	● ● ● ● ●
Y-virus	14	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4 *2	● ● ● ● ●
Ro2/3 *2	● ● ● ● ●
Ro5 *2	● ● ● ● ●
Pa2 *2	● ● ● ● ●
Pa3 *2	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	8	● ● ● ● ●
F2	9	● ● ● ● ●
F6	9	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Erg hoge dosering (>250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Fysiologisch verouderd pootgoed en voorkiemen resulteren in een vroegere oogst.
- Vermijd gronden met een hoog risico op poederschurft.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- CLEOPATRA heeft een vroege knolzetting.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdding en oogst

- CLEOPATRA heeft een vroege afrijping. Loofvernietiging zal geen problemen geven.
- De knollen zijn grof. Voorzichtig rooien en bewaren om beschadiging te voorkomen.



Bewaring

- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- CLEOPATRA is matig resistent tegen Phoma en Fusarium.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.
- Voorkom condensvorming tijdens bewaring.