



Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH

- **Maturação e tuberização precoces**
- **Tubérculos grandes**
- **Boa produção**
- **Bom teor de matéria seca**
- **Adequada para batata frita (palitos)**



Propriedades agronômicas

Maturação	80	Precoce
Periodo de dormencia	60	Medio
Rendimento precoce	94	Medio
Produto final maturação	95	Bom
Tamanho tubérculos	83	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Oval / Alongada-oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Vermelha
Polpa após cozinhar		Amarela clara
Tipo culinário		B - Moderadamente farin
Peso de matéria seca/Aln		20,2% / 14,3%
Teor de matéria seca/Pes		369 / 1,079
Enegrecimento interno	15	Moderado sensível
Sens. ao Metribuzin	65	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	85	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	46.000	29	24
35/45	43.000	31	26
35/55	42.000	32	26
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Resistências

Mildio da folha	26	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	56	● ● ● ● ●
Alternaria	68	● ● ● ● ●
Sarna comum	42	● ● ● ● ●
Sarna pulvuro lenta	55	● ● ● ● ●
Spraing	84	● ● ● ● ●
PVY	14	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	99	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4 *2	● ● ● ● ●
Ro2/3 *2	● ● ● ● ●
Ro5 *2	● ● ● ● ●
Pa2 *2	● ● ● ● ●
Pa3 *2	● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	8	● ● ● ● ●
F2	9	● ● ● ● ●
F6	9	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
-
- Azoto (N): Aplicação muito elevada (>250Kg N/ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.



Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH



Preparação e Plantação

- Permitir que a semente se adapte às condições locais antes da plantação.
- A semente fisiologicamente envelhecida/ o pré-abrolhamento resulta numa cultura mais precoce.
- Evitar solos com risco elevado de sarna pulverulenta.




Cultivo

- Emergência uniforme, com um bom desenvolvimento da folhagem.
- A tuberização é precoce.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.
- Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.



Defenagem e Colheita

- CLEOPATRA tem uma maturação bastante precoce, pelo que a dessecagem não deverá causar problemas.
- Os tubérculos são de calibre grande. O arranque e a armazenagem devem ser efetuados com cuidado para evitar danos e golpes.



Armazenamento

- Secar rapidamente e manter o produto seco para evitar a sarna prateada.
- CLEOPATRA tem uma resistência moderada ao Phoma e ao Fusarium.
- Uma temperatura estável durante o armazenamento previne o desenvolvimento de sarna prateada.
- Evitar a condensação durante o armazenamento.