



## Producción de consumo TRADITIONAL FRESH

- Elevada producción
- Apropiaada para hacer patatas fritas caseras
- Buena resistencia a la sarna común y la sarna pulverulenta
- Alta resistencia al virus Yntn



### Propiedades agronómicas

Maduración	63	Semi- tardia
Período de dormencia	79	Largo
Producción	114	Alta
Tamaño del tuberculo	82	Calibre grande
Forma		Oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Rojo oscuro
Color carne cocinar		Amarilla clara
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		19,1% / 13,2%
/Peso específico		347 / 1,074
Golpeo interno	3	No sensible
Sens. Metribuzin	75	●●●●●
Fenómeno patatitas	90	●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

### Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	42.000	32	26
35/55	39.000	34	28
50/55	37.000	36	30
55/65	36.000	37	31

Profundidad de plantación: normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

### Resistencias

Mildiú en planta	51	●●●●●
Mildiú en el tubérculo	55	●●●●●
Sarna común	65	●●●●●
Sarna verrugosa	66	●●●●●
Spraing	99	●●●●●
Virus Y	98	●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	99	●●●●●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4	1 ●●●●●	F1	10 ●●●●●
Ro2/3	*1 ●●●●●	F2	1 ●●●●●
Ro5	*1 ●●●●●	F6	*1 ●●●●●
Pa2	●●●●●	F18	*1 ●●●●●
Pa3	●●●●●		

\* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

### Fertilización

- Nitrógeno (N): 110 % en comparación con variedades medio-tempranas (como indicación 275 kg de N incluyendo las reservas del suelo).
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.



## Producción de consumo TRADITIONAL FRESH



### Cultivo

- DELIA RED tiene una buena dormencia.
- La prebrotación ayuda a acelerar el crecimiento.
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales.
- DELIA RED se puede cultivar en todo tipo de suelos.
- Se necesita una buena estructura en terrenos pesados para evitar tubérculos deformados.
- "DELIA RED es tolerante al fenómeno de las ""patatitas"", las plantaciones pueden ser tempranas."
- Cuando las patatas se utilizan como semilla para el verdete, la semilla no se debe almacenar con frío.
- Aplicar un tratamiento en el suelo contra rizoctonia en los terrenos sensibles.




### Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- DELIA RED tiene una buena tolerancia a metribuzin.
- Los riegos demasiado abundantes aumentan la dominancia de las lenticelas.
- Utilizar tratamientos estrictos contra Phytophthora, ya que es muy susceptible en planta y tubérculo.
- Utilizar más tarde en el cultivo productos con una fuerte protección en el tubérculo contra el mildiu en el tubérculo.
- Sensible a Phytophthora tanto en el tallo como en el tubérculo.



### Destrucción de las plantas

- Para conseguir una dormencia óptima, se debe destruir la planta cuando esté madura.
- Para mantener una piel brillante y suave, no se deben dejar los tubérculos demasiado tiempo en el suelo después de la destrucción de la planta.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha.



### Almacenamiento

- DELIA RED tiene una buena dormencia, por lo tanto se puede hacer un almacenamiento a temperatura ambiental durante los primeros meses después de la cosecha.
- Secar rápidamente y mantener el producto seco para evitar la sarna plateada.