



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES

- Potentiel de rendement très élevé
- Bonne aptitude à la friture
- Bonne tolérance à la gale commune et à la gale poudreuse
- Haute résistance au virus Yntn



Caractéristiques agronomiques

Maturité	63	Demi-tardive
Période de dormance	79	Longue
Rendement à maturité	114	Élevé
Calibre	82	Gros
Forme		Oblong
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Rouge foncé
Chair après cuisson		Jaune clair
Type de cuisson		AB - Assez ferme
Matière sèche/Amidon %		19,1% / 13,2%
Poids sous l'eau/		347 / 1,074
Noircissement interne	3	Pas de sensibilité
Sens. à la Métribuzine	75	●●●●●○
Boulage	90	●●●●●●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	45 000	30	25
35/45	42 000	32	26
35/55	39.000	34	28
50/55	37.000	36	30
55/65	36.000	37	31

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	51	●●●●○●
Mildiou du tubercule	55	●●●●○●
Gale commune	65	●●●●●○
Gale poudreuse	66	●●●●●○
Virus rattle du tabac	99	●●●●●●
Virus Y	98	●●●●●●
Yntn virus sur tubercule	99	●●●●●●
Nématodes		
Ro1/4	1	●●●●○●
Ro2/3	*1	●●●●○●
Ro5	*1	●●●●○●
Pa2		●●●●○●
Pa3		●●●●○●
Galle Verruqueuse		
F1	10	●●●●●●
F2	1	●●●●○●
F6	*1	●●●●○●
F18	*1	●●●●○●

Fertilisation

- Azote (N): 110% des quantités normalement apportées sur une variété demi-hâtive. (À titre indicatif: 275 kg N, reliquats inclus).
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES



Plantation

- DELIA RED présente une longue dormance.
- La prégermination favorise la croissance de la plante.
- Habituer les plants à la température ambiante avant plantation.
- DELIA RED peut être cultivée sur tous types de sols.
- En sols lourds, veiller à obtenir une bonne structure de sol pour éviter les tubercules difformes.
- DELIA RED est tolérante au boulage, la plantation peut avoir lieu de façon précoce.
- Lorsque des pommes de terre de printemps sont utilisées comme plants pour des cultures d'automne/hiver, les plants ne doivent pas être gardés en chambre froide.
- Nous recommandons de traiter également le sol contre le rhizoctone, en cas de situation à risque.




Culture

- La levée est homogène, avec un bon développement du feuillage.
- DELIA RED a une bonne tolérance à la métribuzine.
- Un excès d'irrigation tard dans le cycle augmente l'apparition de lenticelles.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou sur feuillage et tubercules.
- Utiliser en fin de cycle un programme fongicide efficace contre le mildiou sur tubercules.
- Sensible au Phytophthora sur les fanes et les tubercules.



Défanage et Récolte

- Pour une dormance optimale, défaner une culture sénescente.
- Afin de garder une peau brillante et lisse, récoltez rapidement les tubercules après défanage.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte.



Conservation

- DELIA RED a une bonne dormance. Par conséquent, un stockage à température ambiante peut être utilisé pendant les premiers mois suivant la récolte.
- Sécher rapidement et conserver au sec pour éviter l'apparition de gale argentée.