



Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH

- Großfallend
- Hoher Ertrag
- Eignet sich gut für viele Märkte
- Hoher Trockenstoffgehalt
- Gute Lagerfähigkeit



Sorteneigenschaften

Reifezeit	57	Mittelspät
Keimruhe	60	Mittel
Ertrag	106	Hoch
Sortierung	82	Großfallend
Knollenform		Oval / Langoval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Rot
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		B - Vorwiegend Mehlig
TS/Stärke %		21,5% / 15,6%
UWG/Spez. Gewicht		396 / 1,085
Blaufleckigkeit	16	Empfindlich
Metribuzin Empf.	60	● ● ● ● ●
Knöllchensucht	88	● ● ● ● ●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	51 000	26	22
35/45	46 000	29	24
35/55	43.000	31	26
50/55	41.500	32	27
55/65	39.000	34	28

Resistenz

Krautfäule	43	● ● ● ● ●
Knollenfäule	62	● ● ● ● ●
Alternaria	68	● ● ● ● ●
Schorf	41	● ● ● ● ●
Pulverschorf	51	● ● ● ● ●
Eisenfleckigkeit	93	● ● ● ● ●
Y-Virus	27	● ● ● ● ●
Yntn Knollentoleranz	99	● ● ● ● ●

Nematodenresist.

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●	F1	10	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●	F2	9	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●	F6	9	● ● ● ● ●
Pa2 *2	● ● ● ● ●	F18 *1	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Pa3 *1	● ● ● ● ●			

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Stickstoff (N): Hoher Bedarf (210-250kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH




Vorbereitung und Pflanzung

- Vorkeimen trägt zur Ernteverfrühung bei.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen an den örtlichen Gegebenheiten akklimatisieren.
- Eventuell vorhandene Apikalkeime entfernen. Pflanzen mit kleinen weißen Punkten in den Augen.
- Pulverschorfanfällige Böden vermeiden.




Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- Auf gute Bodenfeuchte achten, um Schorf zu verhindern.
- Bei Schorfgefahr sollte zum Zeitpunkt des Knollenansatzes beregnet werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.
- Eine vorbeugende Behandlung gegen Phytophthora wird empfohlen.



Krautregulierung und Ernte

- In der Regel geht DESIREE gut vom Kraut und wird schnell schalenfest.
- Stellen Sie sicher, dass der Bestand bei der Krautregulierung schon weit in der Abreife ist.
- DESIREE ist mittelanfällig für Blaufleckigkeit, daher Fallhöhen reduzieren und mechanische Beschädigungen vermeiden.
- Ein hohes UWG und Kälte während der Ernte erhöhen das Risiko auf Blaufleckigkeit.



Lagerung

- DESIREE hat eine gute Keimruhe, deswegen ist während der ersten Monate nach der Ernte eine Lagerung bei Umgebungstemperatur möglich.
- DESIREE ist gut lagerfähig, auch über einen längeren Zeitraum.