# DESIREE

URGENTA X DEPESCHE

## TRADITIONAL FRESH

- **Tuberi di grande calibro**
- **Buona resa**
- **Buon adattamento**
- **Buon contenuto di sostanza secca**
- **Buona conservabilità**

## Caratteristiche agronomiche

| | | |
|---|---|---|
| Maturazione | 57 | Medio-tardiva |
| Durata della dormienza | 60 | Moderata |
| Resa | 106 | Alta |
| Calibro del tubero | 82 | Grosso |
| Forma del tubero | | Ovale / Lunga-ovale |
| Numero di tuberi | | 9-11 |
| Colore della pelle | | Rossa |
| Colore pasta cottura | | Giallo chiaro |
| Tipo di cottura | | B - Quasi farinosa |
| Sostanza secca/Amido | | 21,5% / 15,6% |
| Contenuto de sostanza se | | 396 / 1,085 |
| Inbrunimento interno | 16 | Sensibile |
| Sens. al Metribuzin | 60 | |
| Tuberomania | 88 | |

Colore della pelle e pasta

Tipo di cottura

Maturazione

## Densità di semina

| Calibro | Densità di semina/ha | Distanza tra le fila 75 cm | 90 cm |
|---|---|---|---|
| 28/35 | 51.000 | 26 | 22 |
| 35/45 | 46.000 | 29 | 24 |
| 35/55 | 43.000 | 31 | 26 |
| 50/55 | 41.500 | 32 | 27 |
| 55/65 | 39.000 | 34 | 28 |

## Resistenze

| | | |
|---|---|---|
| Peronospora fogliame | 43 | |
| Peronospora del tubero | 62 | |
| Alternaria | 68 | |
| Scabbia comune | 41 | |
| Scabbia polverulenta | 51 | |
| Macchie intern.nematodi | 93 | |
| PVY | 27 | |
| Yntn tolleranza tubero | 99 | |

Res. a nematodi

| | |
|---|---|
| Ro1/4 | *1 |
| Ro2/3 | *1 |
| Ro5 | *1 |
| Pa2 | *2 |
| Pa3 | *1 |

Res. a Rogna Nera

| | | |
|---|---|---|
| F1 | 10 | |
| F2 | 9 | |
| F6 | 9 | |
| F18 | *1 | |

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

## Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
-
- Azoto (N): Bisogni alti (210-250 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.

L'uso di queste informazioni è sotto la responsabilità dell'utente che deve adattarle alla sua situazione. HZPC non si assume alcuna responsabilità. 24 Gen 2025
www.hzpc.com

# DESIREE

URGENTA X DEPESCHE

## TRADITIONAL FRESH



### Preparazione dei tuberi e semina

- La pre-germinazione contribuisce ad anticipare la crescita.
- Permettere al seme di acclimatarsi alle condizioni locali prima di piantare.
- Se è presente un germoglio apicale, rimuoverlo e piantare quando compaiono piccoli germoglietti bianchi.
- Evitare terreni con alto rischio di scabbia polverulenta.



### Coltivazione

- L'emergenza è uniforme con un buon sviluppo fogliare.
- Mantenere una buona umidità del terreno per evitare infezioni da scabbia comune.
- Con rischio di scabbia comune, irrigare la coltura dall'inizio della tuberizzazione.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni sia al fogliame che sui tuberi.
- Trattamenti preventivi contro la Phytophthora sono necessari.

### Maturazione e raccolta

- In generale, i tuberi di DESIREE si distaccano facilmente dagli stoloni e la buccia matura precocemente.
- Assicurarsi che la coltura sia matura al momento del disseccamento.
- DESIREE è moderatamente suscettibile agli urti. Ridurre l'altezza di caduta ed evitare danni meccanici.
- L'alto contenuto di sostanza secca e basse temperature durante il raccolto aumenteranno il rischio di danni meccanici.



### Conservazione

- DESIREE ha una buona dormienza, quindi lo stoccaggio in condizioni naturali può essere utilizzato per i primi mesi dopo la raccolta.
- DESIREE è ben conservabile, anche per un lungo periodo.

L'uso di queste informazioni è sotto la responsabilità dell'utente che deve adattarle alla sua situazione. HZPC non si assume alcuna responsabilità. 24 Gen 2025
www.hzpc.com