



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Goede opbrengst
- Brede aanpassing aan weersomstandigheden
- Goed drogestofgehalte
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	57	Midden laat
Kiemrust	60	Gemiddeld
Opbrengst rijp	106	Hoog
Grofheid	82	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Rood
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		21,5% / 15,6%
OWG/Soortelijk gewicht		396 / 1,085
Blauwgevoeligheid	16	Gevoelig
Sencor gevoeligheid	60	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	88	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	51.000	26	22
35/45	46.000	29	24
35/55	43.000	31	26
50/55	41.500	32	27
55/65	39.000	34	28

Resistenties

Phytophthora loof	43	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	62	● ● ● ● ●
Alternaria	68	● ● ● ● ●
Schurft	41	● ● ● ● ●
Poederschurft	51	● ● ● ● ●
Kringerigheid	93	● ● ● ● ●
Y-virus	27	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2 *2	● ● ● ● ●
Pa3 *1	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	9	● ● ● ● ●
F6	9	● ● ● ● ●
F18 *1		● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte-puntjes-stadium.
- Vermijd gronden met een hoog risico op poederschurft.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Zorg voor een goede vochtvoorziening om gewone schurft te voorkomen.
- In geval van risico op gewone schurft, heeft beregenen tijdens knolzetting de voorkeur.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- In het algemeen laten de knollen goed los en is DESIREE vroeg huidvast.
- Zorgdragen voor een afgerijpt gewas tijdens de loofvernietiging.
- DESIREE is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Een hoog drogestofgehalte en koude omstandigheden tijdens de oogst verhogen de kans op stootblauw.



Bewaring

- DESIREE heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.
- Geschikt voor lange bewaring.