



Consejos generales para la producción de consumo

- Variedad muy fuerte
- Carne amarilla oscura
- Carne firme
- Buena resistencia a la sarna común
- Alta resistencia al virus TRV



Propiedades agronómicas

Maduración	65	Semi-temprana
Período de dormencia	54	Algo corto
Producción	100	Bastante alta
Tamaño del tubérculo	74	Medio
Forma		Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla oscuro
Color carne cocinar		Amarilla oscuro
Tipo de cocción		A - Firme
Materia seca/Almidón %		19% / 13,2%
/Peso específico		346 / 1,074
Golpeo interno	6	Algo sensible
Sens. Metribuzin	61	●●●●●●
Fenómeno patatitas	63	●●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de cocción



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-65 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	60.000	22	19
35/45	52.000	26	21
40/50	44.000	30	25
45/50	44.000	30	25

Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildió en planta	43	●●●●●●
Mildió en el tubérculo	81	●●●●●●
Alternaria	81	●●●●●●
Sarna común	70	●●●●●●
Sarna verrugosa	62	●●●●●●
Spraing	94	●●●●●●
Virus Y	12	●●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	99	●●●●●●
Res. a nemátodos		
Ro1/4	9	●●●●●●
Ro2/3	*1	●●●●●●
Ro5	*4	●●●●●●
Pa2		●●●●●●
Pa3		●●●●●●
Roña		
F1	10	●●●●●●
F2	*5	●●●●●●
F6	*1	●●●●●●
F18	*1	●●●●●●

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aporte bajo (<120-170Kg N/ha incluido las reservas del suelo).
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.
- Prestar atención a la cantidad de abono orgánico para evitar mineralizaciones posteriores.

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial



Consejos generales para la producción de consumo



Cultivo

- EMANUELLE tiene una dormencia media.
- "No desbrotar para evitar el problema de ""patatitas""."
- Dejar calentar la semilla correctamente y plantar con pequeños brotes blancos.
- Dejar atemperar la semilla un mínimo de 3-5 días antes la plantación.
- Para almacenamientos largos, se aconsejan tratamientos en los tubérculos para controlar la sarna plateada. Se puede utilizar Azoxystrobin.
- Tratar siempre la semilla de EMANUELLE contra rizoctonia.
- Plantar EMANUELLE 3 cm más profundo para evitar el verdeamiento.




Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- EMANUELLE tiene una buena tolerancia a metribuzin.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.



Dstrucción de las plantas

- La destrucción de la planta con el follaje algo verde, dará lugar a una piel más brillante.
- En general, EMANUELLE tiene un buen desprendimiento del extremo del estolón y una fijación temprana de la piel.
- En áreas precoces : mínimo dos semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- Recoger solo cuando las condiciones del suelo son las adecuadas.



Almacenamiento

- Con un manejo adecuado de almacén, es posible conservar Tiger por largos periodos.
- Temperatura de almacenamiento: 5 °C.
- Reducir la temperatura 0,5-0,7 °C por día hasta un valor estable de 5°C.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones tempranas y un elevado riesgo a sarna plateada.
- Para almacenamientos largos se deben utilizar inhibidores de brotación.