



Producción de consumo France

- Buena producción
- Buen almacenamiento
- Carne firme
- Muy buen gusto
- Buena resistencia a la sarna común



Propiedades agronómicas

Maduración	65	Semi-temprana
Período de dormencia	54	Algo corto
Producción	100	Bastante alta
Tamaño del tubérculo	74	Medio
Forma		Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla oscuro
Color carne cocinar		Amarilla oscuro
Tipo de cocción		A - Firme
Materia seca/Almidón %		19% / 13,2%
/Peso específico		346 / 1,074
Golpeo interno	6	Algo sensible
Sens. Metribuzin	61	●●●●●
Fenómeno patatitas	63	●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de cocción



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-65 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	38.000	35	29
50/55	35.000	38	32

Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildió en planta	43	●●●●●
Mildió en el tubérculo	81	●●●●●
Alternaria	81	●●●●●
Sarna común	70	●●●●●
Sarna verrugosa	62	●●●●●
Spraing	94	●●●●●
Virus Y	12	●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	99	●●●●●

Res. a nemátodos

Ro1/4	9	●●●●●
Ro2/3	*1	●●●●●
Ro5	*4	●●●●●
Pa2		●●●●●
Pa3		●●●●●

Roña

F1	10	●●●●●
F2	*5	●●●●●
F6	*1	●●●●●
F18	*1	●●●●●

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Consulte siempre las normas locales vigentes sobre fertilización de cultivos.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/ha incluido las reservas del suelo).
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Fosfato (P): aproximadamente 90-100 kg de K/ha antes de la plantación.
- Potasio (K): aproximadamente 200 kg de K/ha antes de la plantación. En suelos con niveles bajos de potasio hay que hacer una aportación adicional de 100 kg.



Producción de consumo France



Cultivo

- EMANUELLE tiene una dormencia media.
- Dejar calentar la semilla correctamente y plantar con pequeños brotes blancos.
- Tratar siempre la semilla de EMANUELLE contra rizoctonia.
- Plantar EMANUELLE 3 cm más profundo para evitar el verdeamiento.




Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- EMANUELLE tiene una buena tolerancia a la sequía.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.



Destrucción de las plantas

- Mínimo dos semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- Recoger solo cuando las condiciones del suelo son las adecuadas.



Almacenamiento

- Con un manejo adecuado de almacén, es posible conservar Tiger por largos periodos.
- Temperatura de almacenamiento: 4 °C.
- Reducir la temperatura en 0,5-0,7 °C por día hasta un valor estable que no sea inferior a 4 °C.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones tempranas y un elevado riesgo a sarna plateada.
- Para almacenamientos largos se deben utilizar inhibidores de brotación.