




Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Zeer sterk ras
- Donkergeel vlees
- Vastkokend
- Goede resistentie tegen schurft
- Hoge resistentie tegen kringerigheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	65	Midden vroeg
Kiemrust	54	Vrij kort
Opbrengst rijp	100	Vrij hoog
Grofheid	74	Gemiddeld
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Donker geel
Vleeskleur na koken		Donkergeel
Kooktype		A - Vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		19% / 13,2%
OWG/Soortelijk gewicht		346 / 1,074
Blauwgevoeligheid	6	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	61	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	63	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-65 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	60.000	22	19
35/45	52.000	26	21
40/50	44.000	30	25
45/50	44.000	30	25

Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	43	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	81	● ● ● ● ●
Alternaria	81	● ● ● ● ●
Schurft	70	● ● ● ● ●
Poederschurft	62	● ● ● ● ●
Kringerigheid	94	● ● ● ● ●
Y-virus	12	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*4	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Stikstof (N) : Lage dosering(120-170Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt




Voorbehandeling en poten

- EMANUELLE heeft een gemiddelde kiemrust.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Warme stoot: Minimaal 3-5 dagen.
- Voor lange bewaring wordt een knolbehandel geadviseerd om zilverschurftaantasting te verminderen.
- Behandel EMANUELLE pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- Plant EMANUELLE 3 cm onder maaiveld om groene knollen te voorkomen.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- EMANUELLE heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- Voor een heldere schil moet het loof nog niet volledig zijn afgerijpt.
- In het algemeen laten de knollen goed los en is EMANUELLE vroeg huidvast.
- Voor de vroege eeltgebeden: Houdt minimaal 2 weken aan tussen doodmaken en oogsten.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- Met het juiste bewaarregime, is EMANUELLE geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 5 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, van 5°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.