




Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Goede opbrengst
- Goede bewaarbaarheid
- Vastkokend
- Zeer goede smaak
- Goede resistentie tegen schurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	65	Midden vroeg
Kiemrust	54	Vrij kort
Opbrengst rijp	100	Vrij hoog
Grofheid	74	Gemiddeld
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Donker geel
Vleeskleur na koken		Donkergeel
Kooktype		A - Vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		19% / 13,2%
OWG/Soortelijk gewicht		346 / 1,074
Blauwgevoeligheid	6	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	61	
Onderzeeërvorming	63	



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-65 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	38.000	35	29
50/55	35.000	38	32

Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	43	
Phytophthora knol	81	
Alternaria	81	
Schurft	70	
Poederschurft	62	
Kringerigheid	94	
Y-virus	12	
Yntn-virus knoltolerantie	99	

Aardappelmoeheid	
Ro1/4 9	
Ro2/3 *1	
Ro5 *4	
Pa2	
Pa3	

Wratziekte	
F1 10	
F2 *5	
F6 *1	
F18 *1	


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat : ca. 90-100 kg/ha. voor het poten.
- Kali: ca. 200 kg/ha. voor het poten. Bij kali-arme gronden nog een overbemesting van 100 kg/ha. na de knolzetting toedienen.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- EMANUELLE heeft een gemiddelde kiemrust.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel EMANUELLE pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- Plant EMANUELLE 3 cm onder maaiveld om groene knollen te voorkomen.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- EMANUELLE heeft een goede droogtetolerantie.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- Minimaal 2 weken tussen loofding en rooien voor een goede huidvastheid.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- Met het juiste bewaarregime, is EMANUELLE geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.