



Producción de consumo GENERAL

- Tubérculos grandes
- Elevada producción
- Apropiaada para hacer patatas fritas caseras
- Buena resistencia al envasado
- Apropiaada para almacenamientos largos

Propiedades agronómicas

Maduración	59	Semi- tardia
Período de dormencia	98	Muy largo
Producción	110	Alta
Tamaño del tuberculo	87	Muy grandes
Forma		Redonda-oval / Oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Amarilla oscuro
Color carne cocinar		Amarilla oscuro
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		19,2% / 13,4%
/Peso específico		350 / 1,074
Golpeo interno	13	Bastante sensible
Sens. Metribuzin	75	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	78	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/55	44.000	30	25

Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo normal.
Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildíu en planta	63	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	69	● ● ● ● ●
Alternaria	77	● ● ● ● ●
Sarna común	71	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	72	● ● ● ● ●
Spraing	91	● ● ● ● ●
Virus Y	99	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 *9	● ● ● ● ●	F1 *9	● ● ● ● ●
Ro2/3	● ● ● ● ●	F2	● ● ● ● ●
Ro5	● ● ● ● ●	F6 *1	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●	F18	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●		

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Consulte siempre las normas locales vigentes sobre fertilización de cultivos.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/ha incluido las reservas del suelo).
- Potasio (K): aprox. 200 kg de K/ha antes de la plantación y 250 kg de K/ha después de la tuberización mejorará la calidad.
- Fosfato (P): aproximadamente 90-100 kg de K/ha antes de la plantación.
- Añadir Calcio y Boro en la fertilización para obtener unos mejores resultados en almacenaje.



Producción de consumo GENERAL



Cultivo

- ESTEBANA tiene una dormencia larga.
- La dominancia apical es bastante fuerte.
- La prebrotación ayuda a acelerar el crecimiento.
- Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas blanquecinas.
- Dejar calentar la semilla correctamente y plantar con pequeños brotes blancos.
- Dejar atemperar la semilla un mínimo de 3 semanas.
- Tratar siempre la semilla de ESTEBANA contra rizoctonia.
- Plantar en terrenos cálidos, no plantar demasiado pronto.
- Plantar ESTEBANA 3 cm más profundo para evitar el verdeamiento.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento.




Período de cultivo

- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- Mantener una humedad adecuada del terreno para una buena cosecha y calidad.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.



Destrucción de las plantas

- El crecimiento del tubérculo puede ser muy rápido al final del ciclo, comprobar regularmente.
- Solo una cosecha con correcta maduración proporcionará un producto apto para un buen almacenamiento.
- Mínimo tres semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- ESTEBANA es moderadamente susceptible al golpeo. Reducir caídas de altura y evitar los daños mecánicos.
- Recoger solo cuando las condiciones del suelo son las adecuadas.



Almacenamiento

- ESTEBANA tiene una buena dormencia, por lo tanto se puede hacer un almacenamiento a temperatura ambiental durante los primeros meses después de la cosecha.
- Con un manejo adecuado de almacén, es posible conservar Tiger por largos periodos.
- ESTEBANA es susceptible al punto negro
- Temperatura de almacenamiento: 4 °C.
- ESTEBANA tiene una dormencia larga. Los inhibidores de brotación solo se necesitan para entregas tardías.
- Antes del confeccionamiento, calentar correctamente los tubérculos hasta alcanzar un valor estable interno entre 10°C - 12°C.