



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation GENERAL

- Tubercules de gros calibres
- Potentiel de rendement très élevé
- Bonne aptitude à la friture
- Bon profil agronomique
- Bonne aptitude à une longue conservation

Caractéristiques agronomiques

Maturité	59	Demi-tardive
Période de dormance	98	Très longue
Rendement à maturité	110	Élevé
Calibre	87	Très gros
Forme		Oblong court / Oblong
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune foncé
Chair après cuisson		Jaune foncé
Type de cuisson		AB - Assez ferme
Matière sèche/Amidon %		19,2% / 13,4%
Poids sous l'eau/		350 / 1,074
Noircissement interne	13	Moyennement sensible
Sens. à la Métribuzine	75	● ● ● ● ●
Boulage	78	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/55	44 000	30	25

Profondeur de plantation: 3 cm plus profond que la normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	63	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	69	● ● ● ● ●
Alternaria	77	● ● ● ● ●
Gale commune	71	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	72	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	91	● ● ● ● ●
Virus Y	99	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4 *9	● ● ● ● ●
Ro2/3	● ● ● ● ●
Ro5	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1 *9	● ● ● ● ●
F2	● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre région.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).
- Potassium (K): environ 200 kg K/ha avant plantation et 250 kg K/ha après tubérisation améliore la qualité.
- Engrais phosphaté (P): environ 90-100 kg P/ha avant plantation.
- Pour une meilleure conservation, inclure du calcium et du bore dans la fertilisation.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation GENERAL




Plantation

- ESTEBANA présente une longue dormance.
- La dominance apicale est assez forte.
- La prégermination favorise la croissance de la plante.
- Si un germe apical est présent, il faut le retirer et planter des plants au stade point blanc.
- Bien réchauffer les plants. Planter au stade point blanc.
- Réchauffement de trois semaines minimum.
- Toujours traiter les plants de ESTEBANA contre le rhizoctone.
- Planter dans des sols chauds, ne pas planter trop tôt.
- Nous recommandons de planter ESTEBANA 3 cm plus profond que la normale pour éviter le verdissement.
- Construire une butte importante pour éviter le verdissement des tubercules.




Culture

- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Maintenir une bonne humidité du sol pour assurer rendement et qualité.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou du feuillage.



Défanage et Récolte

- La croissance des tubercules peut être très rapide à la fin du cycle, vérifier régulièrement le calibre commercial.
- Seule une culture arrivée à maturité donnera un produit stockable.
- Respecter un délai défanage - récolte de 3 semaines minimum.
- ESTEBANA est modérément sensible aux coups bleus. Diminuer la hauteur de chute et éviter les endommagements mécaniques.
- Récolter uniquement quand les conditions optimales sont réunies.



Conservation

- ESTEBANA a une bonne dormance. Par conséquent, un stockage à température ambiante peut être utilisé pendant les premiers mois suivant la récolte.
- Avec une gestion correcte du stockage, ESTEBANA présente une bonne aptitude à la longue conservation.
- ESTEBANA est sensible au point noir
- Température de stockage : 4 °C.
- Quand ESTEBANA est utilisée comme frite ménagère, stocker à 7°C
- ESTEBANA a une longue dormance. L'emploi d'inhibiteurs de germination n'est nécessaire que pour la fin de campagne.
- Avant conditionnement, bien réchauffer les tubercules jusqu'à atteindre une température interne comprise entre 10°C et 12°C.