



GENERAL

- **Tuberi di grande calibro**
- **Alta resa**
- **Idonea per la frittura a casa**
- **Buona resistenza al confezionamento**
- **Idonea per una lunga conservazione**

Caratteristiche agronomiche

Maturazione	59	Medio-tardiva
Durata della dormienza	98	Molto lunga
Resa	110	Alta
Calibro del tubero	87	Molto grosso
Forma del tubero		Tonda-ovale / Ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Giallo intensa
Colore pasta cottura		Giallo intensa
Tipo di cottura		AB - Quasi Soda
Sostanza secca/Amido		19,2% / 13,4%
Contenuto de sostanza se		350 / 1,074
Inbrunimento interno	13	Moderatamente sensibile
Sens. al Metribuzin	75	● ● ● ● ●
Tuberomania	78	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/55	44.000	30	25

Profondità di semina: 3 cm più in profondità del normale.
Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	63	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	69	● ● ● ● ●
Alternaria	77	● ● ● ● ●
Scabbia comune	71	● ● ● ● ●
Scabbia polverulenta	72	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	91	● ● ● ● ●
PVY	99	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●
Res. a nematodi		
Ro1/4 *9		● ● ● ● ●
Ro2/3		● ● ● ● ●
Ro5		● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●
Res. a Rogna Nera		
F1 *9		● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6 *1		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Fare sempre riferimento alle norme locali vigenti in materia di fertilizzazione delle colture.
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Potassio (K): circa 200 kg K/ha prima della semina e 250 kg K/ha dopo la tuberizzazione migliorano la qualità.
- Fosfato (P): circa 90-100 kg K/ha prima della semina.
- Al fine di ottenere una migliore conservazione dei tuberi, è consigliata la somministrazione di Calcio e Boro con la concimazione.



GENERAL



Preparazione dei tuberi e semina

- ESTEBANA ha una lunga dormienza.
- La dominanza apicale è alquanto forte.
- La pre-germinazione contribuisce ad anticipare la crescita.
- Se è presente un germoglio apicale, rimuoverlo e piantare quando compaiono piccoli germoglietti bianchi.
- Bene riscaldare il seme. Seminare con un piccolo germoglio bianco.
- Trattamento termico: minimo 3 settimane.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.
- Piantare in terreni caldi, non piantare troppo presto.
- Piantare ESTEBANA 3 cm in profondità per evitare l'inverdimento.
- Effettuare una buona rincalzatura per evitare la presenza di tuberi verdi.




Coltivazione

- L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un dosaggio inferiore.
- Mantenere un adeguato livello di umidità del suolo per ottenere un prodotto di qualità.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni al fogliame.



Maturazione e raccolta

- I tuberi possono crescere rapidamente alla fine del ciclo, controllarli regolarmente.
- Solo un raccolto maturo darà un buon prodotto conservabile.
- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno tre settimane prima della raccolta.
- ESTEBANA è moderatamente suscettibile agli urti. Ridurre l'altezza di caduta ed evitare danni meccanici.
- Effettuare la raccolta solo quando le condizioni del suolo sono ottimali.



Conservazione

- ESTEBANA ha una buona dormienza, quindi lo stoccaggio in condizioni naturali può essere utilizzato per i primi mesi dopo la raccolta.
- Con una gestione adeguata del stoccaggio, ESTEBANA è adatta per una lunga conservazione.
- ESTEBANA è suscettibile al punto nero
- Temperatura di conservazione: 4 °C.
-
- ESTEBANA ha una lunga dormienza. L'inibitore della germogliazione si rende necessario solo per le spedizioni veramente tardive.
- Prima del confezionamento, riscaldare correttamente i tuberi per raggiungere un valore interno stabile compreso tra 10°C - 12°C.